

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Choledochoduodenostomy – Enterostomy

توصيل القنوات المرارية بالاثني عشر أو الأمعاء الدقيقة

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No

If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
The gall bladder or bile duct is connected to the duodenum (part of the stomach) or small bowel, to allow bile to drain.

C. Risks of a cholecystoduodenostomy / enterostomy

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).

1. المترجم / الاحتياج الثقافي
الحاجة لخدمات الترجمة نعم ☐ لا ☐
إذا كانت الإجابة بنعم ، هل هناك مترجم حاضر ؟ نعم ☐ لا ☐

ب . الحالة المرضية والعلاج
لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و / أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
هو إجراء يتم فيه ربط الحويصلة المرارية أو القناة المرارية بالاثني عشر (جزء من المعدة) أو الأمعاء الدقيقة للسماح بتصريف المادة الصفراء.

ج . مخاطر المفاغرة المرارية الإثناعشرية
لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

- مخاطر عامة:
- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
 - قد يحدث نزيف مما قد يتطلب إعادةتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايباير دامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
 - قد يحدث انسداد للشعبيات الهوائية الصغيرة في الرئة،

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Deep bleeding in the abdominal cavity could occur and this may need fluid replacement or further surgery blockage.
- Damage may occur to the bile ducts near the liver with long term problems with difficulty passing urine after the operation and may need a catheter passed into the bladder until the bladder can empty normally.
- The join between the ducts/gall bladder and bowel may not heal properly and cause leakage of bowel fluid. This may need further surgery.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after surgery and this may cause building up of fluid in the bowel with bloating of the abdomen and vomiting. Further treatment may be necessary
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- The jaundice for which this operation is done may not clear up.
- In some people, healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red and the scar may be painful.
- A weakness can occur in the wound with the development of a hernia. This may need further

- مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح والصدر. مضاعفات في القلب والرئة، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة متعلقة بهذا الإجراء:

- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- حدوث ضرر للأنايب المرارية بالقرب من الكبد والقناة المرارية مسبباً مشكلات طويلة الأمد من الانسداد، مع صعوبة في إدرار البول بعد الجراحة، مما قد يتطلب وضع أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة لإخراج البول حتى تتمكن المثانة من إخراج البول بشكل طبيعي.
- نقطة الاتصال بين القناة المرارية والأمعاء قد لا تلتئم بشكل صحيح وتسبب تسريب لسوائل الأمعاء. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- قد تصاب حركة الأمعاء ببطء في الحركة (مشابهة للانسداد) بعد العملية مما يسبب تراكم السوائل في الأمعاء وانتفاخ للبطن وتقيؤ. قد يتطلب الأمر علاج آخر.
- الإصابة بالتهاب في سوائل البطن كتجمعات للصدى في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصديد جراحياً.
- عدم الشفاء من اليرقان (الصفار) الذي أجريت الجراحة لعلاجها.
- عند بعض المرضى، يحدث التئام الجرح بشكل غير طبيعي. قد تزداد سماكة الجرح ويصبح لونه أحمر وقد يكون الندب مؤلماً.
- قد تصبح منطقة الجرح ضعيفة وينشأ فيها فتق. قد يتطلب علاج ذلك جراحة أخرى.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

surgery.

- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short tremor a long term complication and may need further surgery.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم إجراء القيام بالإجراء
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير
قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained:

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

About Your Anaesthetic Choledochoduodenostomy / Enterostomy Blood and Blood Products Transfusion

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the

ز . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

- التخدير المطلوب لهذا الإجراء . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

- الخيارات الجراحية الطبية والعلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.

- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.

- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.

- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.

- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .

- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

- 0 نوعية التخدير المقدم لي
- 0 توصيل القنوات المرارية بالاثني عشر أو الامعاء الدقيقة
- 0 نقل الدم أو مشتقات الدم لي

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتي والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.

- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعني لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أوافق على الخضوع للإجراء الطبي
اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب
ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح
أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار:

التوقيع:

صلته بالمريض:

التاريخ: الوقت:

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب
لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار
المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد
فهم جميع المعلومات المقدمة له .

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____