

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

تصلب عظام الأذن الوسطى العملية الاستكشافية بالأذن الوسطى وإستئصال عظمة الركاب

إرشادات عامة لفترة ما بعد العملية

بعد إجراء العملية الجراحية نأمل منكم الحرص على الالتزام بالإرشادات التالية:

- عدم تسرب أي ماء إلى داخل الأذن التي خضعت للجراحة و عند الاستحمام يمكن قفل الأذن بسدادة قطنية مغطاة بالفازلين منعاً لتسرب الماء إلى حين ينصح الطبيب بإزالة السدادة القطنية.
- عدم تنظيف الأنف من المخاط بالمنديل لمدة أسبوعين على الأقل.
- ينصح بفتح الفم عند العطس خلال الأسبوعين الأولين من العملية مع مراعاة عدم ضغط أو عصر الأنف لوقف العطاس.
- عدم رفع أو حمل أثقال أو الاجهاد أو الإنحناء لمدة أسبوعين بعد العملية الجراحية.
- عدم الإنحناء أو الإتكاء أو الإستلقاء إلى وراء لأن بذل أي جهد للعودة إلى وضعك السابق قد ينتسبب في نزيف الأذن الوسطى. وعند النهوض من السرير قم بدرجة جسمك معتمداً على اليدين بدلاً من عضلات البطن.

معاودة النشاطات العادية

- يصاب بعض المرضى بالدوار أو الدوخة لبعض الوقت بعد العملية الجراحية لكن يمكنهم قيادة السيارة والعودة للعمل عندما تتحسن حالتهم ويزول الدوار ومتى ما كان عملكم لا يتعارض مع إرشادات رفع الأحمال والأنقال الموضحة أدناه. علماً بأنه كلما ازداد نشاطكم وحيويتكم كلما تحسنت حالتكم بسرعة. مع ضرورة الابتعاد عن استعمال السلم أو الدرج أو كرسي أو مسند القدمين والمناطق المرتفعة غير المحمية تحسباً للاصابة بالدوار أو الدوخة.
- عدم رفع أو حمل أي أثقال يزيد وزنها عن 10 باوند خلال الفترة من 2-4 أسابيع بعد العملية الجراحية ويمكنكم حمل أثقال لا يزيد وزنها على 30 باوند خلال فترة من 6 أسابيع إلى 3 شهور بعد العملية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

وينصح بالمشي بخطوات معتدلة متى ما كنتم لا تشعرون بالدوار . كما يمكنكم معاودة المشي السريع أو الخفيف بما لا يؤثر على القلب بعد أسبوعين من العملية . ويمنع الجري أو العدو إلى ستة أسابيع بعد الجراحة .

- لا ينصح بالسفر بالطائرة خلال فترة 2 أسابيع بعد العملية وخلال الفترة من 3 أسابيع إلى 3 شهور بعد العملية ويمكنكم إزالة احتقان الأنف باستعمال بخاخ افرين الأنفي قبل 30 دقيقة من إقلاع الطائرة وقبل 30 دقيقة من الهبوط.

الاحتياطات والتنبيهات

1. عند الاستلقاء أو النوم ضع وسادة أو وسادتين تحت الرأس والكتفين بحيث يبقى الرأس مرفوعاً وذلك لمدة أسبوعين بعد العملية.

2. لا تنظف أنفك من المخاط بالمنديل حتى يرشدك طبيبك إلى أن أذنك قد شفيت ويمكن سحب الإفرازات المخاطية والتخلص منها عبر الفم مع إفرازات البصاق . كما يمكن تنظيف الأنف بلطف بمنديل ورقي خاصة في حالة الزكام وذلك لمدة 4 أسابيع بعد العملية.

3. لا تغلق أنفك وتدفع بالهواء عبر القناة السمعية.

4. أعطس وفمك مفتوح بحيث يسمح لضغط الهواء بالخروج من الفم.

5. احرص على عدم دخول الماء في الأذنين ويمكنك إزالة سدادة الاذن الخارجية بعد 24 ساعة من العملية، وعند الاستحمام يمكنك سد فتحة الأذن بوضع سدادة قطنية مغطاة بطبقة من الفازلين لمنع تسرب الماء إلى داخل الاذن ونزعها بعد الاستحمام.

6. احرص على عدم الإثحاء أو رفع أي أحمال أو أوزان ثقيلة يزيد وزنها على 20 باوند لفترة 3 أسابيع بعد العملية.

7. ربما تحس بطنين أو طقطقة أو أصوات أخرى داخل الأذن وقد تشعر بضغط الهواء داخل الأذن وفي بعض الأحيان قد تشعر بوجود سائل داخل الأذن.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

8. يمكنكم قيادة السيارة إذا لم تتعرضوا لأي دوّار أو دوخه أو تعب مع عدم تناول أي مسكن للألم خلال القيادة وينصح بعدم السفر بالطائرة خلال 3-4 أسابيع.

الأعراض والآثار الجانبية المتوقعة في فترة ما بعد العملية الدوخة أو الدوار

ربما تصاب بالدوار بعد العملية ويحدث ذلك عادة بسبب انتفاخ الأذن الداخلية وقد لا تشعر بهذا الدوار إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام من العملية وذلك بسبب تفاقم الانتفاخ ويجب عليك تقادي القيام بأية حركات أو تحركات مفاجئة ، كما يجب عليك عدم الوقوف أو النهوض بسرعة.

السمع

لا تقلق أو تنزعج إذا لم يتحسن سمعك بعد العملية مباشرة فقد تم وضع سدادة قطنية داخل قناة الأذن وسدادة أخرى بالأذن الداخلية أثناء العملية وسيقوم الطبيب بنزع سدادة قناة الأذن عند مراجعتكم للعيادة للمتابعة بينما ستدوب سدادة الأذن الداخلية تلقائياً. وفي حالة إجراء عملية لإعادة تصحيح وتحسين السمع فسوف يقوم الطبيب باختبار السمع بعد حوالي 3 شهور من العملية وقد يتطلب الأمر فترة تتراوح من 4 - 6 شهور ليتحسن السمع تماماً.

تصريف سائل دموي

خلال فترة الشفاء يتوقع خروج سائل دموي أصفر أو غزير و نأمل منكم مراجعة العيادة لتصريف هذا السائل كما نأمل منكم إبلاغ الطبيب في حالة وجود سائل كريه الرائحة.

الألم

سيتم اعطاؤكم وصفة طبية لصرف مسكن للألم لاستخدامه لعدة أيام بعد العملية وخلال الأسبوعين الأولين من الجراحة ستتشعرون بألم خفيف بالأذن من وقت لآخر وقد تشعرون بألم أعلى وأمام الأذن وهو ألم شائع عند المضغ. وإذا استمر ألم الأذن ولم يزول رغماً عن استعمال جرعات منتظمة من البانادول لعدة أيام فيجب إبلاغ الطبيب بذلك.

اضطراب التذوق وجفاف الفم

ربما تتعرضون لاضطراب في حاسة التذوق وجفاف الفم وهي من الأعراض الشائعة التي ستستمر لبضعة أسابيع بعد العملية الجراحية وقد يستمر ذلك لبضعة شهور لدى بعض المرضى.