

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Patient Information – Hysterosalpingogram (HSG)

معلومات المريض
الأشعة السينية بمادة الوسط المتباين للرحم وأنابيب الرحم (أنابيب فالوب)

1. What is a Hysterosalpingogram (HSG)?

A Hysterosalpingogram (HSG) is an x-ray procedure where Contrast Media (once called x-ray dye) is used to look at the inside of your fallopian tubes and uterus. The contrast allows your uterus and fallopian tubes to be seen more clearly on the x-ray images.

2. Will there be any discomfort, is any anesthetic needed?

Mild discomfort may occur when the catheter is inserted into your cervix. Mild pain may occur when the contrast is injected and flows through your fallopian tubes. No anesthetic is required for this procedure.

3. Preparation for the procedure?

The medical imaging department will give you instructions on how to prepare for your scan.

To have this procedure and for your own safety you must:

- Talk to staff if you have an active sexually transmitted disease or a pelvic infection.
- NOT be pregnant. You may be asked to take a pregnancy test prior to the procedure.
- NOT be having a 'period'. The procedure is usually done between the end of your menstrual flow and day 10 of your cycle. Please note the start date of your last menstrual period.

4. During the procedure

You will lie down on a table, in the same position as a pelvic examination.

A speculum (the instrument used during a Pap smear) is placed inside your vagina so that your cervix can be easily seen.

A small catheter is placed into your cervix and contrast is put in via the catheter.

X-ray images are taken and reviewed.

The speculum and the catheter are removed at the end of the procedure.

5. After the procedure

You may have 'spot bleeding' and/or slight watery discharge and will need to wear a sanitary pad (not a tampon).

You may have mild abdominal pain for 1 to 2 days after the procedure. Tablets such as Panadol may be taken to relieve mild abdominal pain.

6. What are the risks of this specific procedure?

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Bleeding from vagina, this usually resolves on its own.

1. ما هي الأشعة السينية للرحم وأنابيب الرحم (أنابيب فالوب) ؟
الأشعة السينية للرحم وأنابيب الرحم (أنابيب فالوب) هي إجراء بالأشعة السينية يتطلب استخدام مادة الوسط المتباين (تسمى سابقاً صبغة الأشعة السينية) للكشف على داخل أنابيب فالوب وعلى الرحم. مادة الوسط المتباين تساعد على ظهور أنابيب فالوب و الرحم بشكل أكثر وضوحاً في صور الأشعة السينية.

2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير ؟
قد تشعر المريضة بقدر يسير من عدم الراحة عند إدخال القسطرة في عنق الرحم . قد تشعر المريضة أيضاً بشيء من الألم عند حقن مادة الوسط المتباين وتدفقها داخل قنوات فالوب. القيام بهذا هذا الإجراء لا يتطلب إعطاء أي تخدير .

3. التحضير للإجراء
سيقوم قسم الأشعة والتصوير الطبي بإعطائك تعليمات متعلقة بالتحضير لهذا الإجراء. للقيام بهذا الإجراء ولسلامتك الشخصية ، يجب عليك :

- أبلغني المختص إن كنت تعانين من مرض تناسلي معدي نشط حالياً أو إن كان لديك عدوى في الحوض.
- يجب عليك أن لا تكوني حامل . قد يطلب منك إجراء تحليل للحمل قبل الخضوع لهذا الإجراء.
- يجب أن لا تكوني في فترة الدورة الشهرية . يجري غالباً هذا الإجراء في الفترة ما بين نهاية خروج دم الدورة و اليوم ال 10 للدورة الشهرية. نرجو تذكر اليوم الذي بدأت فيه آخر دورة شهرية.

4. خلال الإجراء
سيطلب منك الاستلقاء على طاولة في نفس وضعية كشف الحوض (الكشف المهبلي). يتم إدخال منظار المهبل (الأداة المستخدمة عند أخذ مسحة عنق الرحم) داخل المهبل لتتم رؤية عنق الرحم بوضوح. يتم إدخال قسطرة رفيعة في عنق الرحم ويتم وضع مادة الوسط المتباين عبر القسطرة . تؤخذ صور بالأشعة السينية وتتم دراستها ومراجعتها . تتم إزالة القسطرة ومنظار المهبل بعد نهاية الإجراء.

5. بعد انتهاء الإجراء
قد يحدث لديك نزيف على شكل نقاط وأو إفراز رطب (مائي) بكمية قليلة ، وستكوني بحاجة لوضع الوسادة (الحفاظة) الصحية ، وليس السدادة القطنية. قد تشعرين بألم بسيط في البطن ليوم أو يومين بعد الإجراء . يمكن تناول أدوية كالپانادول لعلاج ألم البطن الخفيف.

6. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد؟
المخاطر و المضاعفات المرتبطة بهذا الإجراء تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

- مخاطر ومضاعفات شائعة ، وتشمل:
• نزيف من المهبل. غالباً ما يتوقف تلقائياً.



- ### أُمُورُ اتِّفَاقِش حَوْلَهَا مَعَ طَبِيبِي:

[illegible]