

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient Copy Breast Inverted Nipple Repair

نشرة المعلومات الصحية للمريض - تصحيح الحلمة المقلوبة/ الغائرة/ المسطحة-

1. What is an inverted nipple repair?

An inverted nipple is one that retracts in rather than pokes out. Surgical repair of inverted nipples is sometimes required.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor. If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.

1. ما المقصود بتصحيح الحلمة المقلوبة؟

قد تكون الحلمة/ات مقلوبة نحو داخل الثدي بدلا من البروز خارجها، وفي بعض الأحيان تطرأ الحاجة لتصحيح جراحي للحلمة.

2. التخدير

ستتطلب هذه العملية استخدام مخدر. تفقد نشرة المعلومات الصحية للمريض الخاصة بطبيعة التخدير وأنواعه للمزيد من المعلومات حول التخدير ومخاطر التخدير. أعلم طبيبك بخصوص أي تساؤلات قد تكون لديك (إذا لم تكن قد أعطيت نشرة المعلومات، يرجى طلب واحدة).

3. ما هي مخاطر هذا الإجراء النوعي؟

هناك بعض المخاطر والمضاعفات المصاحبة لهذه العملية، وهي تشمل ولا تقتصر على ما يلي:

مخاطر عامة:

- التهاب، وقد يتطلب ذلك العلاج بالمضادات الحيوية وإجراءات علاج أخرى.
- قد يحدث نزيف ما قد يستلزم العودة لغرفة العمليات. ستكون أكثر عرضة للنزيف إذا كنت تتناول أدوية مضادة للتخثر مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفر)، أو ديبيريديمول (أساسانتين أو بيرسانتين).
- قد تصاب بنوبة قلبية أو جلطة نتيجة الضغط والجهد على القلب.
- قد تصاب أجزاء صغيرة من الرئة بالانخماص أو الانغلاق ما يزيد خطر الإصابة بالعدوى والالتهاب، ما قد يتطلب استخدام
- حصول جلطة أو تخثر في الرجل (الإصابة بالخشثر الوريدي العميق) ما يسبب ألم وتورم، وفي حالات نادرة قد تتفصل الجلطة وتصل للرئتين المضادات الحيوية والعلاج الفيزيائي الطبيعي.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Bruising may occur around the operation site.
- The scar may be thickened and red coloured, and it may be painful.
- Sometimes the nipple may contract back inside the breast and be similar to before the operation
- The wound may not meet the expectations of the individual.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

Notes to talk to my doctor about:

- في المرضى المصابين بالسمنة، تزيد نسبة الإصابة بالعدوى والالتهاب في الجرح أو الرئة، والإصابة بمضاعفات في القلب والرئة أو الإصابة بالجلطة.
- الوفاة جرّاء هذا الإجراء أمر محتمل.

مخاطر خاصّة بالإجراء:

- تورّم في منطقة العملية.
- احمرار وتسمك وألم في الندبة
- في بعض الأحيان قد تنقلب الحلمة لداخل الثدي مجدّدا وترجع لما كانت عليه قبل العملية.
- قد لا يعجب أو يلبي الجرح تطلّعات المريض/ة.
- في المدخنين تزيد نسبة الإصابة بالعدوى والالتهاب في الجرح والصدر، والإصابة بمضاعفات في القلب والرئة أو الإصابة بالجلطة.

ملاحظات أناقشها ما الطبيب/الممارس الصحي:
