

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent for Angiogram and Angioplasty/Stenting

الخلل/تركيب دعامة إقرار الموافقة على التصوير الوعائي ورأب

1. What is an Intravenous Pyelogram?

An Intravenous Pyelogram (IVP) uses x-rays and Iodinated Contrast Media to look at the urinary tract (kidneys, ureters, and bladder). An IVP outlines the kidneys, showing their size and internal structure.

This procedure can also show how well the urinary tract is working.

2. Will there be any discomfort, is any anaesthetic needed?

An IVP is a painless procedure, no anaesthetic is required.

The Contrast used for IVP studies will not discolour your urine or cause any discomfort when you pass urine.

3. Preparation for the procedure.

The medical imaging department will give you instructions on how to prepare for your procedure.

- A bowel preparation kit. The bowel must be completely clear for the procedure to be accurate and complete. Be sure to follow the directions carefully otherwise you may have to be rebooked.
- Please tell the staff if you are or suspect you might be pregnant or are breastfeeding.

4. During the procedure

- You may be asked to empty your bladder prior to starting the procedure.
- X-ray images will then be taken of your abdomen before the contrast is injected.
- A fine needle (IV cannula) will be put into a vein in your arm, making it possible to inject the contrast.
- After the injection of contrast a series of x-ray images are taken at timed intervals.
- A compression belt may be placed around your abdomen to slow down the flow of the contrast.
- You may be asked to empty your bladder before the last picture is taken.
- The IV cannula will be removed at the end of the procedure.

5. What are the risks of this specific procedure? The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.

Less common risks and complications include:

- Injected contrast may leak outside of the blood vessel, under the skin and into the tissue. This may require treatment. In very rare cases, further surgery could be

1. ما هو تصوير الحوض البولي والحالبين ؟

تصوير الحوض البولي والحالبين هو إجراء يستخدم الأشعة السينية و مادة الوسط المتباين المعالجة باليود لرؤية الجهاز البولي (الكلى ، الحالبين ، والمثانة البولية). يقوم هذا الإجراء برسم حدود الكلى مظهراً حجمها وأجزائها الداخلية.

يمكن لهذا الإجراء أيضاً إظهار مدى كفاءة الجهاز البولي في القيام بوظائفه. للمزيد من المعلومات عن مادة الوسط المتباين المعالجة باليود وعن المخاطر المرتبطة بها ، نرجو قراءة ورقة معلومات المريض المتعلقة بمادة الوسط المتباين المعالجة باليود . (إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها).

2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟
تصوير الحوض البولي والحالبين إجراء لا يسبب أي ألم وليس هناك حاجة لأي تخدير.

مادة الوسط المتباين المستخدمة في تصوير الحوض البولي والحالبين لا تسبب تغييراً في لون البول ولا تسبب أي شعور بعدم الراحة عند التبول.

3. التحضير للإجراء

يقوم قسم التصوير الطبي بإعطائك التعليمات المتعلقة بكيفية التحضير لهذا الإجراء.

- عدة تحضير الأمعاء . من الضروري أن تكون الأمعاء خالية تماماً لضمان دقة واكتمال الإجراء . تأكد من اتباعك للتعليمات المبلغة لك بكل دقة حتى لا يتم الاضطرار لإعطائك موعد آخر.
- نرجو إبلاغ الموظفين إن كنت حاملاً أو تشكين في كونك حاملاً أو تمارسين الرضاعة الطبيعية.

4. أثناء الإجراء

- قد يطلب منك إفراغ المثانة قبل بدء الإجراء.
- يتم بعد ذلك عمل أشعة سينية تقليدية (بدون مادة وسط متباين) للبطن.
- يتم وضع إبرة صغيرة في أحد أوردة ذراعك (خط وريدي) ليتمكن من خلالها حقن مادة الوسط المتباين.
- بعد حقن مادة الوسط المتباين ، يتم أخذ سلسلة من صور الأشعة السينية ضمن فترات زمنية محددة.
- قد يوضع حزام ضاغط حول بطنك للتقليل من تدفق مادة الوسط المتباين .
- قد يطلب منك إفراغ المثانة قبل التقاط آخر صور بالأشعة السينية.
- يتم في نهاية الإجراء إزالة الخط الوريدي.

5. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

مخاطر ومضاعفات هذا الإجراء تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- ألم بسيط ، كدمة و \ أو عدوى في موضع دخول الخط الوريدي . قد يتطلب ذلك العلاج بمضادات حيوية.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- مادة الوسط المتباين المحقونة قد تتسرب إلى خارج الوعاء الدموي ، تحت الجلد وإلى داخل الأنسجة. قد يتطلب ذلك علاج. في حالات نادرة قد تكون هناك حاجة لجراحة إذا حدث تهنك للجلد.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

required if the skin breaks down.

- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Risks of Iodinated Contrast for patients with renal impairment:

There is a specific risk of giving Iodinated Contrast Media to patient's identified as having *Renal Impairment*.

Giving the Contrast to people with weakened kidneys (renal impairment) can cause further kidney damage, which may in turn cause the kidneys to stop working properly (acute renal failure).

Rare risks and complications include:

- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Death as a result of this procedure is *very rare*.

6. What are the safety issues when you leave the hospital?

Go to your nearest Emergency Department or GP if you become unwell.

Notes to talk to my doctor/health practitioner about:

- قد لا يمكن القيام بالإجراء لأسباب طبية وأو فنية (تقنية).

د . مخاطر مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

- المخاطر المحددة لمادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.
- إعطاء مادة الوسط المتباين لمرضى يعانون من ضعف عمل الكلى قد يسبب أضراراً إضافية للكلى ، مما قد يسبب توقف الكلى عند العمل بشكل صحيح (فشل كلوى حاد).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- زيادة معدل الخطر للإصابة بالسرطان خلال الحياة بسبب التعرض للأشعة السينية.
- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً .

6. ما هي الأمور المتعلقة بالسلامة بعد مغادرة المستشفى؟

توجه لأقرب قسم طوارئ أو لطبيبك العام إذا شعرت بأنك لست على ما يرام .

أمور أتناقش حولها مع طبيبي/الممارس الصحي:
