

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

**Patient Information -
Swallow / Meal Under Imaging Guidance
Using Contrast Media**

معلومات المريض –
تصوير الجهاز الهضمي العلوي أثناء بلع وجبة
من مادة الوسط المتباين

1. What is a Swallow / Meal under Imaging?

A Swallow Meal is an x-ray procedure of the oesophagus, stomach, and upper small bowel.
A series of x-ray images are taken while you swallow contrast (once called x-ray dye).

Sometimes, food items are coated with contrast and you will be asked to swallow them while x-ray images are being taken.

A Modified Swallow Study or Video Swallow is a similar x-ray procedure that studies how you swallow.

2. Will there be any discomfort, is any anaesthetic needed?

A Swallow /Meal under Imaging is a painless procedure, no anaesthetic is required.

3. Preparation for the procedure

The medical imaging department will give you instructions on how to prepare for your procedure.

- Please tell staff if you are or suspect you might be pregnant.

4. During the procedure

You will be asked to swallow the contrast while x-ray images are being taken.

You may be asked to swallow a liquid, a powder, or a tablet which will produce a gas in the stomach. This may make you feel full and will allow the doctor to look at your stomach.

5. After the procedure

Your stool may appear white for a few days after the procedure, this is normal.

It is important to drink plenty of water for a few days after the procedure to avoid constipation and dehydration.

6. What are the risks of this specific procedure?

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following:

Common risks and complications include:

- Vomiting may occur and require treatment with medication.
- Constipation, drinking extra fluids and laxatives can help with this.
- Diarrhoea, causing dehydration, drinking extra fluids can help with this.

1. ما هو تصوير الجهاز الهضمي العلوي أثناء بلع وجبة من مادة الوسط المتباين ؟

تصوير الجهاز الهضمي العلوي أثناء بلع وجبة من مادة الوسط المتباين هو إجراء بالأشعة السينية يشمل المريء ، المعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة. يتم التقاط سلسلة من صور الأشعة السينية بينما يقوم المريض ببلع مادة الوسط المتباين (يطلق عليها سابقاً صبغة الأشعة السينية).

يتم أحياناً استخدام مواد غذائية مغلفة بمادة الوسط المتباين ويطلب من المريض ابتلاعها أثناء التقاط صور الأشعة السينية.
دراسة وجبة البلع المعدلة أو البلع بتصوير الفيديو : هي دراسة مشابهة بالأشعة السينية تعني بدراسة كيفية البلع.

2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟

وجبة البلع تحت التصوير لا تسبب أي ألم ، وليس هناك ضرورة لأي مخدر.

3. التحضير للإجراء

يقوم قسم التصوير الطبي في المستشفى بإعطائك تعليمات عن كيفية التحضير للإجراء.

- نرجو إبلاغك العاملين إن كنت حاملاً أو كنت تشكين في كونك حامل

4. أثناء الإجراء

سيطلب منك بلع مادة الوسط المتباين أثناء التصوير بالأشعة السينية.

قد يطلب منك بلع سوائل أو مادة على شكل بودرة أو حبة دواء مما قد يسبب غازات في المعدة . قد يعطيك ذلك شعوراً بالامتلاء ، وهو ما يمكن الطبيب من رؤية معدتك.

5. بعد الإجراء

قد يكون لون البراز أبيض خلال الأيام القليلة التي تعقب الإجراء . هذا أمر طبيعي.

من الضروري شرب كميات كبيرة من الماء لعدة أيام بعد الإجراء لتفادي حدوث إمساك وجفاف.

6. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

مخاطر ومضاعفات هذا الإجراء تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- قد يحدث تقيؤ يتطلب العلاج بأدوية.
- حدوث إمساك ، شرب كميات كبيرة من السوائل واستخدام الملينات قد يساعدان في علاج ذلك.
- إسهال يسبب الجفاف ، شرب كميات كبيرة من السوائل قد يساعد في علاج ذلك.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Less common risks and complications include:

- Pneumonia may occur if fluid from the stomach goes into the lungs. May require antibiotic and further treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Allergic reaction to the Contrast. This could result in a rash, hives, itching, nausea, fainting or shortness of breath. Medication may be given to relieve this.
- Death as a result of this procedure is very rare.

7. What are the safety issues when you leave the hospital?

Go to your nearest Emergency Department or GP if you become unwell.

Notes to talk to my doctor/ health practitioner about:

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- قد يحدث التهاب رئوي عند انتقال سوائل من المعدة إلى الرئتين. قد يتطلب ذلك مضادات حيوية وعلاجات أخرى.
- قد لا يمكن القيام بالإجراء لأسباب طبية وأو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- زيادة خطر الإصابة بالسرطان خلال الحياة بسبب التعرض للأشعة السينية.
- رد فعل تحسسي لمادة الوسط المتباين . قد يشمل ذلك طفح جلدي ، احمرار وازدياد في سماكة الجلد (ارتيكاريا) ، حكة ، غثيان ، إغماء أو ضيق في التنفس . قد يتطلب ذلك إعطاء أدوية للعلاج.
- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً .

7. ما هي الأمور المتعلقة بالسلامة بعد مغادرة المستشفى؟

توجه لأقرب قسم طوارئ أو لطبيبك العام إذا شعرت بأنك لست على ما يرام.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي \ الممارس الصحي:
