

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Vermilionectomy

استئصال حافة الشفة

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure.
(Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following procedure will be performed:
All or part of the visible lower 'red' lip will be removed. This will leave an open wound. This wound will be closed by moving the inside of the lower lip. This is sewn to the skin below the "red" lip to make a new lower lip.

C. Risks of a vermilionectomy

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Bleeding could occur and may require a return to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need

1- المترجم / الاحتياج الثقافي
هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم حاضر ؟
ب . الحالة المرضية والعلاج
لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
تتم إزالة كل أو جزء من جزء الشفة المرئي ذو اللون الأحمر. يترك ذلك جرحاً مفتوحاً. يتم إغلاق هذا الجرح بتحريك الجزء الداخلي للشفة السفلية. يتم خياطة ذلك مع الجلد الموجود أسفل المنطقة الحمراء من الشفة لخلق شفة سفلية جديدة.

ج. مخاطر استئصال حافة الشفة

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتين أو اساسانتين).
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

antibiotics and physiotherapy.

- Increased risk in obese people of wound infection, infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The surgery to close the skin may fail. This may cause bad scarring, and you may need further surgery.
- Blood and fluid may build up under the new red lip, which may need removal.
- The lip will not look like a normal lip with stitches in place. The colour changes between days 1 to 5. Once the stitches are removed, the lower lip will not look like a normal lip for some time. In extreme cases, the lip may never look normal.
- A scar at the border between the red lip and the skin below the lip. The scar may become very thick, red, itchy and thickened. These are difficult to treat and can be disfiguring.
- A collection of blood in the tissues due to unwanted bleeding. If this occurs it increases the appearance of bruising. Swelling can lead to slow healing or a failure to heal.
- Infection which can lead to poor healing of the wound. This may require antibiotics and further treatment.
- The new lip tissue covering the wound may die. This may cause a larger scar or may need further surgery.
- The diseased tissue may not all be removed at surgery. This may need further surgery and removal of a wider piece of tissue.
- Increased risk in smokers of wound and chest

للصدر.

- عند عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- قد تفشل جراحة إغلاق الجلد . قد يؤدي ذلك إلى نشوء ندب سيئ وقد يتطلب الأمر جراحة أخرى.
- قد يحدث تراكم للدم والسوائل تحت الشفة الحمراء الجديدة . قد يتطلب الأمر إزالة هذه التجمعات.
- لن تظهر الشفة كأي شفة طبيعية في وجود الغرز الجراحية. يتغير اللون في غضون 1-5 أيام. بمجرد إزالة الغرز ، لا تظهر الشفة السفلية بشكل طبيعي لبعض الوقت. في أسوأ الحالات ، قد لا يكون مظهر الشفة طبيعياً إلى الأبد.
- وجود ندب في منطقة الحدود بين الشفة الحمراء والجلد أسفلها. قد يصبح الندب شديد السماكة ، أحمر اللون ، يكون سميكاً ومسبباً للحكة. من الصعب علاج ذلك ، وقد يتسبب في حدوث تشوه.
- تجمع السوائل في الأنسجة بسبب نزيف غير مرغوب فيه . عند حدوث ذلك فإنه يزيد من ظهور الكدمة. التورم قد يؤدي إلى تأخر الالتئام أو عدم حدوث الالتئام.
- حدوث عدوى مما يسبب ضعف التئام الجرح ، مما قد يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- قد يموت نسيج الشفة الجديدة الذي يغطي الجرح. قد يؤدي ذلك إلى حدوث ندب أكبر أو قد يتطلب جراحة أخرى.
- قد لا تتم الإزالة الكاملة للنسيج المريض خلال الجراحة. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى وإزالة لمساحة أوسع من النسيج.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

infections, heart and lung complications and thrombosis. Smoking before or after surgery can also cause complications ranging from excessive bleeding and bruising to major wound breakdown.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed).

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are

- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية. قد يسبب التدخين قبل أو بعد الجراحة أيضاً مضاعفات تتراوح ما بين النزيف المفرط وحدوث كدمة إلى تهتك وانفصال شديد في جوانب الجرح.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب بالمعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

specific to me.

- Other relevant procedure options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

☐ **About Your Anaesthetic**

☐ **Vermilionectomy**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed investigation and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my investigation and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

• الخيارات الإجرائية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.

• المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.

• عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.

• قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .

• احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.

• إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .

• قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

☐ **نوعية التخدير المقدم لي**

☐ **استئصال حافة الشفة**

• منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتى والتعبير عن

مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح

ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على

استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

• أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعى لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

• أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار

يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

القرار:

التوقيع:

صلته بالمريض:

التاريخ: الوقت:

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ:

التوقيع: الوقت:

2) الاسم: _____ التاريخ:

التوقيع: الوقت:



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____