

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Amputation

معلومات الإقرار – نسخة المريض البتز

1. What do I need to know about this procedure?

An amputation procedure is the removal of part of a limb that has been irreparably damaged by poor blood supply, infection or major damage from trauma.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic OR Epidural and Spinal Anaesthetic** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the

1. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟
البتز هو الإجراء الذي يتم به إزالة جزء من أحد الأطراف الذي حدث له ضرر غير قابل للإصلاح بسبب ضعف التدفق الدموي ، العدوى أو حدوث ضرر كبير لهذا الجزء بسبب إصابة ما .

2. التخدير الذي أتلقيه
يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ ورقة معلومات التخدير المقدم لك أو ورقة التخدير النصفي (التخدير الشوكي و تخدير فوق الجافية) المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها .

3. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟
هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

- #### مخاطر عامة:
- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
 - حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار داباييردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
 - قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
 - عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
 - قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

strain on the heart.

- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The blood supply to the tissue left after amputation may not be sufficient and further higher amputation may be necessary.
- The wound may be very slow to heal and may become infected. This may need long term wound care and antibiotics.
- There may be abnormal feeling and pain where the amputated limb was previously.
- The limb may become fixed in a position, which is not compatible with good function, if an artificial limb is to be fitted. Exercises and physiotherapy may be advised.
- Healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red (a keloid scar) and the scar may be painful.
- Loose skin may need adjustment with further surgery if a prosthesis is to be fitted.
- Return to function and mobility is difficult to predict and normal activities may not be fully restored.

Notes to talk to my doctor about

دماغية.

- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة :

- قد لا يكون التدفق الدموي في النسيج المتبقي من الطرف المبتور كافياً ، مما قد يتطلب بترأً آخرأً لنفس الطرف في منطقة أعلى .
 - قد يكون التئام الجرح بطيئاً جداً ، وقد تحدث عدوى للجرح. قد يتطلب ذلك عناية طويلة الأمد للجرح واستخدام المضادات الحيوية.
 - قد يكون هناك إحساس غير طبيعي وألم في المنطقة التي كان فيها الجزء المبتور.
 - قد يثبت الطرف على وضعية معينة غير مناسبة لقيامه بوظيفته بشكل جيد إذا كانت هناك رغبة في وضع الطرف الصناعي له. قد ينصح الطبيب بالتمارين الرياضية والعلاج الطبيعي.
 - قد يلتئم الجرح بطريقة غير طبيعية ، وقد تزداد سماكة الجرح ويصبح أحمر اللون (تكون ندبة الجدره: وهي تليف للجلد يعقب الجروح) وقد تكون مؤلمة.
 - قد تكون هنا حاجة لتسوية الجلد الطليق (الزائد والذي كان يغطي الجزء المبتور) عن طريق جراحة أخرى إذا كان هناك توجه لوضع طرف صناعي.
 - من الصعب توقع مقدار عودة الطرف لممارسة وظيفته أو مقدار الحركة التي يمكن استعادتها . قد لا يمكن استعادة كامل النشاطات التي سبقت البتر.
- أمر أتناقش حولها مع طبيبي:**
