

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Patient Information

Catheter Check with IV Iodinated Contrast

معلومات المريض
التحقق من القسطرة باستخدام مادة الوسط المتباين
المعالجة باليود المحقونة عبر الوريد

1. What is a Catheter Check?

A catheter check is an x-ray procedure that is uses Iodinated Contrast Media (once called x-ray dye) to check that your catheter is not blocked and that it is in the correct position.

The contrast allows the catheter to be seen clearly on the x-ray image.

2. Will there be any discomfort, is any anaesthetic needed?

A Catheter Check is a painless procedure, no anaesthetic is required.

3. Preparation for the procedure

The medical imaging department will give you instructions on how to prepare for your procedure.

- Please tell the staff if you are or suspect you might be pregnant or breast feeding.

4. During the procedure

Your catheter will be connected to a syringe filled with contrast.

The contrast will be injected as x-ray images are taken. You must remain as still as possible. At times, you may be asked to hold your breath.

After the images have been taken, if no other procedures are required, your catheter will be flushed and capped.

5. What are the risks of this specific procedure?

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- No known common risks

Less common risks and complications include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- Injected contrast may leak outside of the blood vessel, under the skin and into the tissue, this may require treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Death as a result of this procedure is very rare.

1. ما هو إجراء التحقق من القسطرة ؟

التحقق من القسطرة هو إجراء بالأشعة السينية تستخدم فيه مادة الوسط المتباين المعالجة باليود (تسمى سابقاً صبغة الأشعة السينية) للتحقق من أن القسطرة الموجودة لديك غير مسدودة وفي موقعها الصحيح.

مادة الوسط المتباين تسمح بظهور القسطرة بشكل واضح في صور الأشعة السينية.

2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟

التحقق من القسطرة إجراء لا يسبب أي ألم ، وليست هناك حاجة لأي تخدير.

3. التحضير للإجراء

يقوم قسم التصوير الطبي بإعطائك التعليمات المتعلقة بكيفية التحضير لهذا الإجراء.

- نرجو إبلاغ موظفي القسم إن كنت حاملاً أو تشكين في كونك حاملاً.

4. أثناء الإجراء

سيتم توصيل القسطرة بمحقنة مملوءة بمادة الوسط المتباين. يتم حقن مادة الوسط المتباين.

يتم حقن مادة الوسط المتباين بينما تؤخذ صور بالأشعة السينية.

يجب أن تظل ثابتاً دون حركة قدر الإمكان. قد يطلب منك في وقت ما أن تحبس أنفاسك.

بعد أخذ الصور وعند عدم وجود حاجة لأي إجراء آخر ، يتم شطف (تسليك) القسطرة وإغلاقها.

5. ما هي المخاطر المحددة لهذا الإجراء؟

المخاطر والمضاعفات لهذا الإجراء تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- لا توجد مخاطر شائعة معروفة.

مخاطر ومضاعفات أقل شيوعاً وتشمل :

- عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- تفاعل تحسسي للأدوية التي أعطيت أثناء القيام بالإجراء. تتطلب علاجات أخرى.
- قد تتسرب ماد الوسط المتباين المحقونة خارج الوعاء الدموي ، تحت الجلد وداخل الأنسجة. قد يتطلب ذلك معالجة.
- قد لا يكون القيام بالإجراء ممكناً لأسباب طبية و / أو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- زيادة معدل خطر الإصابة بالسرطان خلال الحياة بسبب التعرض للأشعة السينية.
- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Risks of Iodinated Contrast for patients with renal impairment:

There is a specific risk of giving Iodinated Contrast Media to patient's identified as having *Renal Impairment*. Giving the Contrast to people with weakened kidneys (renal impairment) can cause further kidney damage, which may in turn cause the kidneys to stop working properly (acute renal failure).

6. What are the safety issues when you leave the hospital?

Go to your nearest Emergency Department or GP if you become unwell.

Notes to talk to my doctor/health practitioner about:

مخاطر مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

المخاطر المحددة لمادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

إعطاء مادة الوسط المتباين لمرضى يعانون من ضعف عمل الكلى قد يسبب أضراراً إضافية للكلى ، مما قد يسبب توقف الكلى عند العمل بشكل صحيح (فشل كلوي حاد).

6. ما هي الأمور المتعلقة بالسلامة بعد مغادرة المستشفى؟

توجه لأقرب قسم طوارئ أو لطبيبك العام إذا شعرت بأنك لست على ما يرام.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي \ الممارس الصحي :
