

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

**Consent Information – Patient Copy
Drug Challenge Testing (Oral)**

**معلومات الإقرار – نسخة المريض
اختبار تحمل الدواء (عن طريق الفم)**

1. What is a drug challenge test (oral)?

Recordings of routine baseline observations (blood pressure - BP, pulse - P and pulse oximetry - SpO2 etc) will be made. A cannula may then be inserted into a vein (intravenous cannula). Diluted samples of the test drug will be prepared. The most dilute specimen will be swallowed.

Routine monitoring of observations (BP, P, SpO2 etc) will be observed and recorded.

Providing no adverse reaction occurs to the first dose, samples of increasing concentration will be given sequentially.

The development of any signs of allergy or "anaphylaxis" will be regarded as a POSITIVE result. For example low BP (hypotension), wheezy chest (bronchospasm), swelling of the face and /or throat (angioedema), a skin reaction (rash).

If significant discomfort occurs, treatment with antihistamine, adrenaline or intravenous fluids will be given as required.

I understand that Direct Drug Challenge testing is not without risk. There is a small chance of a severe reaction.

2. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this investigation. They include but are not limited to the following.

Specific risks:

- As with any drug reaction, the most severe risk is Death.
- Other severe risks:
 - Low Blood pressure (Hypotension)
 - Wheeze (Bronchospasm)
 - Swelling of the face and throat (Angioedema)
 - Cardiac Arrest
- If a serious complication arises during testing this may require admission to hospital as part of the treatment.

3. What do I need to know about medication?

Some medications can interfere with testing.

It is very important that you discuss any medications you are taking with the doctor beforehand. If it is possible you may need to stop some medications before the tests but this needs to be discussed with the doctor.

Notes to talk to my doctor about:

1. ما هو اختبار تحمل الدواء (عن طريق الفم)?

يتم تسجيل الملاحظات الاعتيادية المبدئية (ضغط الدم ، النبض و نسبة تشبع الدم بالأوكسجين ، الخ) . قد يتم بعد ذلك إدخال إبرة الخط الوريدي في الوريد. يتم تحضير عينات مخففة من دواء الاختبار. يتم تناول (بلع) أكثر عينة تم تخفيفها (العينة الأهل تركيزاً للدواء) . يتم مراقبة و تسجيل الملاحظات الاعتيادية (ضغط الدم ، النبض و نسبة تشبع الدم بالأوكسجين ، الخ).

شريطة عدم ظهور تفاعلات عكسية للجرعة الأولى من دواء الاختبار ، يتم تناول عينات ذات تركيز متزايد من الدواء بشكل متعاقب. يعتبر ظهور أي علامة للحساسية المفرطة نتيجة إيجابية ، مثل انخفاض الضغط ، صفير في الصدر (تشنج مجاري التنفس) ، تورم (استسقاء وعائي) في الوجه وأو الحنجرة ، ردود فعل على الجلد (الطفح الجلدي). عند ملاحظة عدم ارتياح شديد بسبب الدواء ، تتم المعالجة بمضادات الهيستامين ، الأدرينالين أو المحاليل الوريدية وذلك حسب الحاجة. يجب على المريض أن يكون على معرفة تامة بأن الاختبار المباشر لتحمل الدواء لا يخلو من المخاطر . هناك احتمال ضئيل بحدوث رد فعل شديد.

2. ما هي المخاطر المحددة لهذا الإجراء؟

هناك مخاطر و مضاعفات مرتبطة بهذا الاختبار و هي تشمل ، ولكنها غير محصورة في ما يلي:

مخاطر محددة:

- كما هو الحال مع أي تفاعل لأي دواء ، فإن الخطر الأكبر هو الوفاة.
- مخاطر أخرى شديدة:
 - انخفاض ضغط الدم
 - صفير في الصدر (تشنج مجاري التنفس)
 - تورم الوجه و الحنجرة (استسقاء وعائي)
 - السكتة القلبية
- عند حدوث مضاعفات خطيرة لاختبار الدواء قد يتطلب ذلك تنويم المريض في المستشفى كجزء من العلاج.

3. ما الذي ينبغي علي معرفته عن الدواء؟

قد تتداخل بعض الأدوية مع الاختبار . من الضروري أن تتناقش مع الطبيب حول أي أدوية تتناولها قبل خضوعك للاختبار. إذا كان ذلك ممكناً ، فقد تضطر للتوقف عن تناول بعض الأدوية قبل إجراء الاختبار ، إلا أن ذلك ينبغي مناقشته مع الطبيب.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
