

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient Copy Excision of a Lesion & Flap Repair

معلومات الإقرار – نسخة المريض
استئصال منطقة متضررة & الرقعة المشتملة على أوعية دموية

1. What do I need to know about this procedure?

The lesion (diseased area of skin and tissue) will be removed with some surrounding normal skin. Other tissues and skin next to the cut area will be moved to cover the area from where the diseased part was cut out.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthesia OR Local Anaesthesia & Sedation for Your Procedure information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor. If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. Important information.

Before the operation, you must tell the surgeon performing the operation and the anaesthetist of:

- any medical problems
- any allergies
- prescribed drugs (particularly blood thinning drugs such as Aspirin or Warfarin)
- your use of recreational drugs
- your alcohol consumption
- your use of herbal remedies

Any drugs containing Aspirin or similar compounds should be stopped before surgery as this increase the risk of bleeding and, therefore, collection of blood under the skin.

Smoking in the pre or post-operative period is known to cause complications.

1. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟

تتم إزالة الضرر (المنطقة المريضة في الجلد و الأنسجة) مع بعض الجلد السليم المجاور له. يتم نقل الجلد والأنسجة الأخرى المجاورة للمنطقة التي تم استئصالها لتغطية المنطقة المتضررة التي أزيل منها المرض.

2. التخدير الذي أتلقيه

هذا الإجراء يتطلب الخضوع للتخدير. اقرأ ورقة تعليمات التخدير المقدم لك أو التخدير الموضعي والدواء المسكن المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. معلومات هامة

قبل العملية يجب إبلاغ الجراح وطبيب التخدير المسؤولين عن حالتك بالتالي:

- أي مشاكل صحية يعاني منها المريض
- أي نوع من أنواع الحساسية
- الأدوية الموصوفة التي يتناولها المريض (بالأخص الأدوية المسببة لزيادة سيولة الدم كالأسبرين والوارفرين)
- استخدام المريض لأي نوع من أنواع المخدرات أو العقاقير الترفيهية
- احتساء المريض للكحوليات
- استخدام المريض للعلاجات العشبية.

يجب قبل الخضوع للجراحة التوقف عن تناول أي دواء يحتوي الأسبرين أو أي مركبات مشابهة لأنها تزيد من خطر النزيف مما قد يسبب تجمع للدم تحت الجلد.

من المعروف أن التدخين قبل وبعد الجراحة يسبب المضاعفات. من المهم إبلاغك للطبيب عن احتياجاتك مثل ممارسة الرياضة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

It is important you tell the surgeon what your needs are such as exercise, weight loss and restriction of activities that you may need to do immediately after flap surgery.
The operation will result in a scar or scars. Make sure you know before the surgery as to the type of scar or scars, the size and where your scar/s will be.
The surgeon may ask you to do certain things before you can have surgery, such as exercise, weight loss and stopping smoking.
If you do not do as the surgeon tells you, the surgery may not be successful. For this reason, the surgeon may refuse to do your surgery.

4. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Impaired circulation may occur to a limb or to an organ which may require further treatment.
- Death or brain damage as a result of this procedure are possible.

Specific risks:

- The skin flap may not heal well. This may result in a larger, less acceptable scar or may need further surgery.
- Blood and fluid may build up under the flap and may need removal.

، إنقاص الوزن والحد من الأنشطة و هو ما قد تضطر للقيام به مباشرة بعد الجراحة الترقيعية.
ينتج عن الجراحة ندب أو ندوب جراحية. تأكد قبل خضوعك للإجراء من معرفتك بنوع الندب أو الندوب ، حجم هذه الندوب والأماكن التي ستكون فيها هذه الندوب.
قبل الجراحة ، قد يطلب منك الجراح القيام ببعض الأمور مثل ممارسة الرياضة ، إنقاص الوزن والتوقف عن التدخين.
إن لم تتبع تعليمات الطبيب ، فقد يفشل الإجراء ، ولهذا السبب ، قد يرفض الجراح إخضاعك للإجراء.

4. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار داييابير دامول (بيرسانتن أو اساسانتين).
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- قد يحدث ضعف في الدورة الدموية في أحد الأطراف أو أعضاء الجسم مما قد يتطلب معالجة أخرى .
- الوفاة أو حدوث ضرر للمخ محتمل كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- قد لا تلتئم رقعة الجلد بشكل جيد . قد يسبب ذلك ظهور ندب أكبر من حيث المساحة وأقل قبولاً من المريض أو قد يتطلب جراحة أخرى.
- قد يتراكم الدم والسوائل تحت الرقعة وقد يتطلب ذلك إزالتها.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- The skin flap may never look like normal tissue.
- Scars always result from surgical cuts and all surgery leaves scars. The scar due to flap surgery will be larger than the size of the area from where the skin was removed.
- Faint, thickened, red, lumpy and itchy scars. These are very difficult to treat, and can be disfiguring.
- Bleeding which may cause a haematoma (a collection of blood) in the tissues. Swelling can slow down healing and it may spoil the final result. In extreme cases, further surgery will be needed to drain the blood from underneath the flap. In extreme cases, the flap may die entirely.
- Infection which can lead to a thickened and swollen flap. This will need further surgery and antibiotics. Infection can also cause the flap to die.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis. Smoking will increase the risk of flap failure.

Notes to talk to my doctor about:

• قد لا تظهر الرقعة الجلدية مطلقاً بصورة مشابهة للنسيج الطبيعي .

• تنتج الندوب عادةً بسبب الشقوق الجراحية. وكل جراحة تتسبب في وجود ندوب. الندب الناتج عن الجراحة الترقيعية يكون أكبر من مساحة المنطقة التي أزيل منها الجلد.

• تصعب معالجة الندوب الباهتة ، السميكة ، ذات اللون الأحمر ، المتكتلة والمسببة للحكة. قد تسبب هذه الندوب تشوهاً.

• النزيف : قد يسبب ذلك تجمع للدم في الأنسجة (تورم دموي). التورم قد يجعل التئام الجرح بطيئاً وقد يفسد النتيجة النهائية للجراحة. في الحالات الشديدة ، قد تكون هناك حاجة لجراحة أخرى لسحب وتصريف الدم من تحت الرقعة. في الحالات الشديدة قد يحدث الموت الكامل للرقعة.

• حدوث العدوى قد يسبب تورم وزيادة سماكة الرقعة. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى واستخدام المضادات الحيوية. قد تسبب العدوى أيضاً موت الرقعة.

• عند المدخنين تزداد مخاطر عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية. التدخين يزيد من معدلات فشل الرقعة.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
