

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient Copy Breast – Fine Needle Aspiration

معلومات الإقرار – نسخة المريض سحب عينات من الثدي باستخدام إبرة متناهية الدقة والصغر

1. What is a fine needle aspiration?

A fine needle is inserted into the breast to obtain samples for pathology testing.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See Local Anaesthetic for Your Procedure information sheet for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor. If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Asprin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Death as a result of this procedure is very rare.

Specific risks:

- Bruising may occur about the operation site or deeply in the breast. This may need surgical drainage.
- The correct tissue may not be obtained and the pathology report may not be accurate. Further

1. ماهو إجراء سحب عينات من الثدي باستخدام إبرة متناهية الدقة والصغر؟

يتم إدخال إبرة متناهية الدقة والصغر داخل الثدي للحصول على عينات يتم فحصها من قبل مختبر علم الأمراض

2. التخدير الذي أتلقاه

يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ تعليمات التخدير الموضعي المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يعقب أخذ العينة حدوث نزيف مما قد يتطلب إعادة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايبييردامول (بيرسانتن أو اساسانتن)
- تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهابات الجرح عند أصحاب الأوزان الزائدة، وكذلك التهابات وعدوى الصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، و تجلطات في الأوعية الدموية.
- يمكن حدوث وفاة كنتيجة لهذا الإجراء

مخاطر خاصة:

- حدوث كدمات حول موضع العملية أو في مناطق عميقة من الثدي وقد يستدعي ذلك تجفيف جراحي.
- قد لا يتم سحب النسيج الصحيح وقد لا يكون تقرير اختصاصي علم الأمراض دقيقاً. قد تكون هناك ضرورة لأخذ عينة (خزعة).



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

biopsy may be necessary.

- Technical problems may occur in the collection and pathology preparation of the specimen resulting in an inaccurate report.
- Rarely the needle may penetrate deeply and go through the chest wall and pierce the lung causing collapse of the lung. This may require treatment to re-inflate the lung.

Notes to talk to my doctor:

- قد تحدث بعض المشكلات الفنية فيما يتعلق بجمع العينة والتحضيرات المخبرية لها ، مما يؤدي إلى عدم دقة تقرير مختبر علم الأمراض.
- من النادر جداً أن تذهب الإبرة المستخدمة عميقاً مخترقةً جدار الصدر ومحدثةً ثقب في الرئة يؤدي إلى انهيار الرئة (انطباقها). قد يتطلب حدوث ذلك إجراءات علاجية لإعادة ملئ الرئة بالهواء.

أمر أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
