

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Parent/Patient Copy Hydrocele Repair – Division of Processus Vaginalis – Child/Young Person

معلومات الإقرار – نسخة والد المريض/المريض
إصلاح كيس السائل المصلي - تقسيم (تفريق)
الطفل/صغير السن

1. What do I need to know about this procedure?

The tube is divided and closed to allow the fluid, which has collected in the sac of the testicle to drain normally.

2. My Anaesthetic.

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Child's Anaesthetic** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin or aspirin.
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Impaired circulation may occur to a limb or to an organ which may require further treatment.

Specific risks:

- Rarely, the fluid remains after the surgery and further surgery may be necessary.

1. ما الذي ينبغي علي معرفته عن هذا الإجراء؟
يتم تقسيم الأنبوب ثم إغلاقه للسماح بالتصريف الطبيعي للسائل المتجمع في كيس الخصية.

2. التخدير الذي أتلناه
سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لطفلك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة.
إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها .

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟
هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين أو الأسبرين.
- قد يحدث إنغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- انخفاض تدفق الدم لأحد أعضاء أو أطراف الجسم والذي قد يتطلب معالجات أخرى.

مخاطر خاصة بهذا الإجراء:

- من النادر بقاء السوائل بعد الجراحة مما قد يتطلب عملية أخرى.



DoB: _____

- ## أمور أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج

[illegible]