

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Laparotomy

معلومات الإقرار – نسخة المريض الفتح الجراحي للبطن (الاستكشاف البطني)

1. What do I need to know about this procedure?

A laparotomy is a surgical examination of the inside of the abdomen and the internal organs for any abnormality. This is done through a 15-30cm cut into the abdomen, depending on the size of the abdomen.

2. My Anaesthetic.

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.
If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and

1. ما الذي ينبغي علي معرفته عن هذا الإجراء ؟

الاستكشاف البطني هو فحص جراحي لداخل البطن ولأعضاء الداخلية لاكتشاف أي أمر غير طبيعي . يتم القيام بذلك عبر شق جراحي في جدار البطن يتراوح طوله من 15-30 سنتيمتر ، ويتوقف ذلك على حجم البطن.

2. التخدير الذي أتلقيه

قد يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير . اقرأ تعليمات التخدير الموضعي والأدوية المسكنة المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك .
للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة . إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج .
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها .

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتين أو اساسانتين)
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.

Specific risks:

- Deep bleeding in the abdomen. This may need fluid replacement, blood transfusion or further surgery. This may mean a longer stay in hospital and longer recovery time.
- Damage to other organs, such as bladder or bowel, which may need further surgery. This may mean a longer stay in hospital and longer recovery time.
- Infections such as pus in the abdomen. This may need surgical drainage and antibiotics.
- Bowel blockage after the operation. This may be temporary or in the longer term. Treatment may be drip to give fluids into the vein and no food or fluids by mouth. If it doesn't get better, bowel surgery may be necessary which may include colostomy. This can be temporary or permanent.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause a bowel obstruction. This can be a short term or a long term complication and may need further surgery.
- The wound may not heal normally. The scar can be thickened and red and may be painful. This is permanent and can be disfiguring.
- Poor wound healing. The wound may burst open which may require long term wound care with dressings and antibiotics or a hernia, i.e. rupture can form in the long term. This may need repair by further surgery.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.
- Very low possibility of a fistula (a connecting passage between one area and another) developing.
- There is a possibility that the symptom(s)/pain you have been experiencing and the reason for this operation, may not resolve or worsen as a

جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.

مخاطر محددة متعلقة بهذا الإجراء:

- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى. وقد يعني ذلك أن تطول فترة إقامة المريض في المستشفى عما كان متوقعا ، وأن تطول فترة التعافي.
- ضرر يصيب أعضاء أخرى كالمثانة البولية أو الأمعاء . قد يتطلب الأمر جراحة أخرى ، وقد يعني ذلك أن تطول فترة إقامة المريض في المستشفى عما كان متوقعا ، وأن تطول فترة التعافي.
- الإصابة بعدوى كتجمعات للصدية في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصديد جراحياً ومضادات حيوية.
- انسداد في الأمعاء يعقب العملية. قد يكون ذلك مؤقتاً أو يحدث على المدى البعيد. قد يكون العلاج بوضع المريض على سوائل ورديّة تعطى بواسطة محقنة مع عدم الأكل أو الشرب عن طريق الفم ، وإذا لم يتحسن الأمر ، فقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية مع احتمال عمل (فغر للقولون) وهي فتحة فتحة في القولون مؤقتة أو دائمة.
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.
- قد يحدث التئام الجرح بشكل غير طبيعي. قد تزداد سماكة الندب الجراحي ويصبح لونه أحمر وقد يكون مؤلماً. هذا الأمر يكون دائماً وقد يسبب تشوه.
- التئام ضعيف وغير مكتمل للجرح . قد ينفجر الجرح ويتطلب عناية لفترة طويلة بالضمادات والمضادات الحيوية ، وقد يحدث على المدى البعيد فتق (تمزق) في الجرح ، وقد يتطلب ذلك إصلاحه بجراحة أخرى.
- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.
- هناك خطر ضئيل بتكوّن ناسور (ممر غير طبيعي بين منطقتين).
- من مضاعفات هذا الإجراء أن لا يحدث تغيير (لا إلى الأحسن ، ولا إلى الأسوأ) في الأعراض/ الألم التي كنت تعاني منه وفي الأسباب التي دفعتك للخضوع لهذا الإجراء ، بعد الانتهاء منه.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

complication of the procedure.

- The cause of pain/other symptoms sometimes cannot be found, if you are having an exploratory operation.

Notes to talk to my doctor about:

- إذا كان الغرض من الجراحة استكشافياً ، فقد لا يمكن في بعض الأحيان معرفة سبب ما كنت تشعر به من ألم/ أعراض أخرى.

أمور أناقشها مع طبيبي:
