

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient Copy Cosmetic Surgery

معلومات الإقرار – نسخة المريض الجراحة التجميلية – شفط الدهون

1. What do I need to know about this procedure?

This procedure is a surgical suctioning of fat deposits from specific parts of the body. This surgery is not recommended for prominent fatty areas. This technique is not a substitute for weight loss or exercise.

Important Information:

Using liposuction alone, the skin is not tightened surgically. Therefore, it is best suited to people who are in good physical shape and who have skin quality which has youthful characteristics, preferably people under the age of 35.

The procedure is usually performed under anaesthetic, and you will be in hospital from 2 to 4 days and resting in bed for up to 24 hours. Local anaesthesia is usually limited for small areas. The procedure tends to use very small cuts. Areas of contour defect can be improved by liposuction of the face, neck, breasts, fatty areas above the breast near the arm crease, the sides of the breasts, breast enlargement in men, the waist area in both sexes, the buttocks, the outer thighs (jodhpur deformity), the inner thighs, knees, calves, ankles and also the arms. The abdomen can also be reshaped. Post-surgical or post-traumatic fat deposits can also be suction contoured.

After surgery, a snug dressing will be placed on the wound for at least seven to 14 days. Where possible a commercially made support garment such as a long-legged panti-girdle, support tights, abdominal binder or surgical bra will be used. Some form of support dressing is usually used for up to eight weeks.

1- ما الذي ينبغي علي معرفته عن هذا الإجراء؟

يشمل هذا الإجراء الشفط الجراحي للتراكمات الدهنية من مناطق معينة من الجسم.

لا ينصح بإجراء هذه الجراحة في المناطق الدهنية البارزة. هذا الإجراء ليس بديلاً لإنقاص الوزن أو ممارسة الرياضة.

معلومات مهمة:

عند الاكتفاء بإجراء شفط الدهون ، لا يتم شد الجلد جراحياً. لذا ، فإن العملية مناسبة أكثر لمن لديهم بنية جسمانية جيدة وخصائص جلد فنية . يفضل أن يكون المريض تحت سن ال 35.

يتم الإجراء عادة تحت التخدير ، ويتم تنويم المريض في المستشفى لـ 2-4 أيام ، كما أن عليه الراحة والبقاء على السرير لـ 24 ساعة. استخدام التخدير الموضعي مقتصر على المناطق الصغيرة. الشقوق الجراحية لهذا الإجراء صغيرة جداً . المناطق التي بها خلل في محيطها وشكلها يمكن تحسينها بشفط الدهون في الوجه ، العنق ، الثديين ، المناطق الدهنية فوق الثدي بالقرب من تجعدات الإبط ، جوانب الثديين ، تكبير الأثداء عند الرجال ، منطقة الخصر عند الجنسين ، الأرداف ، الجهة الخارجية للفخذين (تشوه جودبور) ، الجهة الداخلية للفخذين ، الركبتين ، عضلات الساق ، الكاحلين وكذلك الذراعين.

يمكن أيضاً إعادة تشكيل البطن . التراكبات الدهنية التي تعقب الجراحة أو الإصابة ، يمكن أيضاً شفطها وتعديل شكلها ومحيطها.

بعد الجراحة ، توضع غيارات وضادات محكمة على الجرح لفترة 7-14 يوم على الأقل ، وكلما أمكن ذلك ، فمن الأفضل ارتداء ملابس داعمة متوفرة في الأسواق مثل الملابس الداخلية المشدودة الطويلة الشبيهة بالبنطلون ، الملابس الداخلية المشدودة الداعمة للفخذين ، حزام البطن أو حمالة الصدر الجراحية. يتم عادة ارتداء بعض أنواع هذه الملابس الداعمة لفترة ثمان أسابيع.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Pain after surgery is usually a discomfort and lasts for several days to one week. The amount of pain will be based on the size of the procedure and individual tolerance.

You can have a shower within a few days. Ask the surgeon before surgery about the massage program after surgery. Reasonable activities can be carried out after two to three weeks. Strenuous activities can usually be resumed after six weeks. It may take up to six to eight weeks before the benefits of the procedure are visible. Patients can be expected to wait up to six months to see the final results. The aim with this operation is to gain improvement and not perfection.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing

يظهر الألم بعد العملية كشعور بعدم الراحة ويستغرق من عدة أيام إلى أسبوع. يتوقف حجم الألم على حجم الإجراء والفروقات الفردية بين المرضى في تحمل الألم.

يمكنك الاستحمام خلال بضعة أيام . قبل الجراحة ، إسأل الجراح عن برنامج التدليك الذي يعقب الجراحة. يمكنك ممارسة النشاطات المعتدلة بعد 2-3 أسابيع من الإجراء. يمكن العودة لممارسة النشاطات المجهدة بعد ستة أسابيع. قد يستغرق الأمر مرور 6-8 أسابيع قبل أن يبدأ المريض في ملاحظة فوائد و إيجابيات الجراحة. قد يطلب من المرضى أن ينتظروا لفترة تقارب الستة أشهر لرؤية النتائج النهائية للجراحة. الهدف من هذه الجراحة هو إحداث التحسين وليس الوصول إلى الكمال.

2-التخدير الذي أتلقيه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير.

اقرأ ورقة تعليمات التخدير المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.

إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3-ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار داباير دامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.

- Impaired circulation may occur to a limb or to an organ which may require further treatment.
- Death or brain damage as a result of this procedure are possible.

Specific risks:

- Too much or too little fat may be removed, which may result in contour defects such as rippling or dimpling. This is worse in people over 35 years and/ or overweight. This may require a second operation.
- Numbness, which usually disappears after some months.
- Bruising is characterised by skin discolouration, blue and black areas, and texture irregularity. This can last for up to three weeks and longer in many cases. In some cases lumpy areas may last longer and may be improved by massage. Infection. This may produce altered cosmetic results or delay healing of the wound.
- A collection of blood or a watery fluid in the operation site, which may produce the worst cosmetic result and may delay wound healing. A second operation may be necessary to remove the blood or serum.
- Skin loss is a very rare occurrence.
- Swelling when the knees and inner thighs are treated and particularly ankle which may last longer than a week.
- Excess skin following the procedure. This may need surgical removal for a good cosmetic result. When a lengthy procedure is performed on multiple extensive areas, a blood transfusion may exceptionally be required.

علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.

- قد يحدث ضعف في الدورة الدموية في أحد الأطراف أو أعضاء الجسم مما قد يتطلب معالجة أخرى.
- الوفاة أو حدوث ضرر للمخ محتمل كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- قد تتم إزالة كمية من الدهون أكثر مما هو مطلوب أو إزالة كمية دهون أقل مما هو مطلوب ، مما قد يسبب خلل في الشكل والمظهر كالتموجات أو التثقيب. يكون ذلك بشكل أسوأ عند من تتجاوز أعمارهم الـ 35 وأو ذوي الأوزان الزائدة. قد يضطر هؤلاء المرضى للخضوع لجراحة أخرى.
- حدوث خدر . عادة ما يختفي ذلك خلال بضعة أشهر.
- حدوث كدمة تسبب تغير في لون الجلد ، مناطق زرقاء وسوداء ، وعدم انتظام في بنية وملمس المنطقة التي خضعت للجراحة . قد يستمر ذلك ثلاثة أسابيع أو أكثر في العديد من الحالات. في بعض الحالات قد يستمر وجود منطقة الكتل غير المنتظمة لفترة أطول وقد تتحسن مع التئام الجرح.
- تراكم دم أو سوائل تشبه الماء (مصل الدم) في موضع الجراحة والذي قد يسبب أسوأ النتائج التجميلية وقد يؤخر التئام الجرح. قد تكون هناك حاجة لجراحة أخرى لإزالة الدم أو مصل الدم.
- فقدان الجلد . يحدث بشكل نادر جداً.
- تورم عند معالجة الركبتين والجهة الداخلية للفخذين ، وخصوصاً في الكاحل حيث قد يستمر التورم لأكثر من أسبوع.
- وجود فائض من الجلد بعد الانتهاء من الإجراء . قد يتطلب ذلك الإزالة الجراحية للحصول على نتائج تجميلية جيدة. عند القيام بجراحة طويلة في مناطق متعددة وواسعة ، فقد يتطلب الأمر نقل دم بشكل استثنائي.



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Notes to talk to my doctor about:

أمر أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
