

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient Copy Oesophagoscopy

معلومات الإقرار – نسخة المريض تنظير المريء

1. What is an oesophagoscopy?

An oesophagoscopy is a procedure used to check for physical abnormalities in the oesophagus (the structure in the throat that carries food to the stomach). The procedure may involve the removal of the foreign body if present.

2. My anaesthetic?

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet** OR **Local Anaesthetic and Sedation for Your Procedure information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor. If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need

1. ما هو تنظير المريء؟

تنظير المريء هو إجراء يتم القيام به للبحث عن أي ظهور غير طبيعي جسماني (في بنية) المريء. المريء : هو العضو الموجود في الحلق الذي ينقل الطعام إلى المعدة. قد يشمل الإجراء إزالة أي جسم غريب في حالة وجوده.

2. التخدير الذي أتلقيه

هذا الإجراء يتطلب الخضوع للتخدير. اقرأ ورقة معلومات التخدير المقدم لك أو التخدير الموضعي والدواء المسكن المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايابايردامول (بيرسانتن أو اساسانتين).
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- قد يحدث إنغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

antibiotics and physiotherapy.

- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications and thrombosis.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Injury to the lips, teeth, gums or tongue. Dental injury may result in teeth being chipped, broken or dislodged.
- Perforation or rupture of the oesophagus. This may lead to a serious infection in the neck or chest which is life threatening. Surgery involving the neck and/or chest is usually required to repair the perforation and treat the infection and a prolonged stay in hospital will be required. This infection, or the surgery required to treat the perforation, may cause injury to the larynx (voice box) or the nerves controlling the larynx resulting in an abnormal voice.
- Voice change. The larynx (voice box) or the nerves controlling the larynx may be injured by the instruments used for the oesophagoscopy. Voice change may also result from perforation of the oesophagus as outlined above.

Notes to talk to my doctor about:

استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.

- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- ضرر للشفتين ، الأسنان ، اللثة أو اللسان. الأضرار الحادثة للأسنان قد تسبب انفصال جزء صغير من السن ، تكسر السن أو خروجه من مكانه.
- ثقب أو تمزق المريء مما قد يسبب التهاب خطيرة في العنق أو الصدر وتكون مهددة لحياة المريض. تكون هناك عادةً ضرورة لجراحة في العنق وأو الصدر لإصلاح الثقب وعلاج التهاب. يتطلب هذا الأمر أيضاً فترة بقاء أطول في المستشفى. هذه العدوى أو الجراحة المطلوبة لإصلاح الثقب قد تسبب ضرراً للحنجرة أو الأعصاب المغذية لها مما يسبب تغيير في صوت المريض.
- تغيير في الصوت . قد تحدث إصابة للحنجرة أو الأعصاب المغذية لها بواسطة الآلات المستخدمة في منظار المريء. قد يحدث أيضاً تغيير في الصوت بسبب ثقب المريء كما هو مذكور آنفاً.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
