

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Orchidectomy

معلومات الإقرار – نسخة المريض استئصال الخصية

1. What do I need to know about this procedure?

An Orchidectomy is the removal of one or both of the testicles and possible removal of hormone producing substance from one or both of the testicles. The doctor will record which side on the consent form.

2. My anesthetic

This procedure will require an anesthetic.

See **About Your Anesthetic information sheet** for information about the anesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the

1. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟

في هذا الإجراء يتم استئصال إحدى أو كلا الخصيتين مع احتمال إزالة النسيج الذي ينتج الهرمون من إحدى أو كلا الخصيتين. يحدد الطبيب في نموذج إقرار المريض الجانب الذي تجرى فيه الجراحة.

2. التخدير الذي أتلقيه

يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير .

اقرأ ورقة تعليمات التخدير المقدم لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه . إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.

إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها .

3. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دابيبيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

strain on the heart.

- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Major swelling in the scrotum after the operation.
- If both testicles are removed, there is loss of the main male hormone producing tissue. This will have an effect on male characteristics and sexual function.

Notes to talk to my doctor about:

دماغية.

- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- تورم كبير في كيس الخصيتين بعد الجراحة.
- عند إزالة الخصيتين ، يكون هناك فقدان للنسيج المنتج لهرمون الذكورة الرئيسي. يكون لذلك تأثير على مظاهر وخصائص الذكورة و على الوظيفة الجنسية.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
