

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Parent/Patient Copy Paraphimosis Repair Child/Young Person

معلومات الإقرار – نسخة والد المريض\المريض
الإصلاح الجراحي لاحتجاز الجلد الأمامي للقضيب (القلقة)
خلف حشفة القضيب الطفل/صغير السن

1. What do I need to know about this procedure?

Surgical repair of the skin, which has tightened at the end of the penis.

2. My Anaesthetic.

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Child's Anaesthetic** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur which may require treatment including antibiotics.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin or Aspirin.
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Impaired circulation may occur to a limb or to an organ which may require further treatment.
- Death or brain damage as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- It may be necessary to slit the skin to allow

1. ما الذي ينبغي علي معرفته عن هذا الإجراء؟
هو إجراء جراحي للجلد المشدود في نهاية العضو الذكري.

2. التخدير الذي أتلقيه

قد/ سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لطفلك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة.
إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟
لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين أو الأسبرين.
- قد يحدث إنغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- انخفاض تدفق الدم لأحد أعضاء أو أطراف الجسم والذي قد يتطلب معالجات أخرى.
- الوفاة أو تضرر المخ محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر خاصة بهذا الإجراء:

- قد يكون من الضروري (شق) الجلد لإتمام الإصلاح. قد تكون



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

repair. A circumcision may be necessary in the future.

- Swelling in the shaft of the penis and in the foreskin. This will settle in time.

Notes to talk to my doctor about:

هناك ضرورة للقيام بالختان في المستقبل.

- تورم في محور القضيب وفي الجلد الأمامي له . يتعافى ذلك مع الوقت.

أمر أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
