

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient Copy Reduction Mammoplasty

معلومات الإقرار – نسخة المريض جراحة تصغير الثدي التجميلية

1. What do I need to know about this procedure?

This procedure removes some breast tissue from either one or both breasts.

The breast, breast tissue and the skin will also be surgically re-fashioned, so that the nipple will be elevated and the shape of the breast improved. The surgeon will mark a pattern of the surgery on the breast and surrounding skin immediately before the operation.

Important Information

The operation will keep the patient in hospital for only a day or two, unless there are complications, in which case there may be a longer stay in hospital. It takes two to four weeks to heal. Effort will be taken to ensure that the breasts are made the same size and contour. Either the shape of the scar will involve a circle scar around the nipple, an up/down scar passing below the nipple down to meet a curved cross-wise scar. This may be a long scar, which runs from near the middle of the chest in front to the outside of the breast near the armpit.

The cross-wise part of the scar is long following large reductions, and can usually be seen at each end on close inspection. The up/down usually fades and can be slightly stretched.

Patients who have had a reduction mammoplasty are advised not to breastfeed. Part of the breast tissue may be separated from the normal anatomy of the ducts and the nipple. On other occasions milk output may be too limited in reduction operations on enormous breasts.

In order to stop the nipple from dying, it may be essential to graft its' attached nipple high up on

1- ما الذي ينبغي علي معرفته عن هذا الإجراء؟

يتم في هذا الإجراء إزالة بعض نسيج الثدي ، وذلك من أحد الثديين أو كلاهما.

يتم أيضاً إعادة التشكيل الجراحي للثدي ، نسيج الثدي والجلد بحيث يتم رفع حلمة الثدي وتحسين مظهر الثدي.

مباشرة قبل الجراحة ، يقوم الجراح برسم خطوط وشكل الجراحة على الثدي والجلد المجاور له.

معلومات مهمة

تتطلب الجراحة بقاء المريض في المستشفى ليوم أو يومين فقط ، مالم تحدث مضاعفات تستدعي بقاء المريض لفترة أطول.

يتطلب الالتئام فترة زمنية مابين 2-4 أسابيع.

تبذل كل الجهود لجعل الثديين بنفس الحجم والبنية .

شكل الندب إما أن يشتمل على ندب دائري حول حلمة الثدي ، ندب للأعلى وللأسفل يمر تحت حلمة الثدي نزولاً ليتقابل مع ندب عرضي منحني. قد يكون ذلك ندباً طويلاً يمر من المنطقة القريبة من منتصف الصدر في الجهة الأمامية إلى خارج الثدي بالقرب من الإبط.

يكون الجزء العرضي من الندب طويلاً في حالات تصغير الصدر الكبيرة ، وعادةً ما يمكن رؤية نهايته عند التدقيق عن قرب. الندب الذي يمر للأعلى والأسفل عادةً ما يبهت ويختفي وقد يحدث له تمدد بسيط.

ينصح المرضى الذين خضعوا لعملية تصغير الثدي بعدم ممارسة الرضاعة الطبيعية. قد لا يكون جزء من نسيج الثدي عن موقعه التشريحي الطبيعي في اتصاله بأنابيب وحلمة الثدي. وفي حالات أخرى قد يكون إنتاج الحليب محدوداً جداً بعد عمليات تصغير الثدي في الأثناء الكبيرة.

لمنع موت حلمة الثدي ، من الضروري وضعه كرقعة في أعلى نسيج الثدي . يجعل ذلك الرضاعة الطبيعية عن طريق الثدي

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

the breast tissue. This will make breast feeding totally impossible. Often the tip of the nipple can take up to one month to heal after this special operation. There is no evidence that this operation will cause breast cancer. It may reduce the risks of cancer because breast tissue is actually removed. Once healed, normal breast examinations can be done. If anything a smaller tumour would be easier to detect because of its relative size is bigger in a smaller breast.

Post-operative pain is difficult to assess. Sometimes patients have differing amounts of pain in each breast. There may be some tender spots but these are usually temporary. Increasing or severe post-operative pain is usually a sign of complications and the surgeon should be notified immediately.

There can be no guarantee with any surgery. Improvement is the aim and not perfection. Complications do develop and a further operation may be required to improve the result. Improvement is the aim. Perfection is not always possible. Further operations may be required to improve the result, particularly if complications arise as mentioned above.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor. If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

مستحيلة تماماً. غالباً يستغرق طرف الحلمة شهراً كاملاً ليلتئم بعد هذا الإجراء الخاص. ليست هناك دلائل على حدوث سرطان الثدي بعد هذه الجراحة. قد تؤدي هذه الجراحة إلى التقليل من الإصابة بسرطان الثدي لأنها تشتمل على إزالة فعالية لنسيج الثدي.

بعد الالتئام ، يمكن القيام بفحوصات الثدي الطبيعية . يصبح اكتشاف أي ضرر أو ورم أكثر سهولة لأن حجمه سيكون كبيراً مقارنة بحجم الثدي بعد خضوعه للتصغير. من الصعب تقييم الألم بعد الجراحة. أحياناً يكون قدر الألم مختلفاً في كل ثدي عن الآخر. قد تكون هناك مواضع مؤلمة عند لمسها ، إلا أن ذلك يكون مؤقتاً. الألم الشديد أو المتزايد بعد الجراحة يكون عادةً علامة على وجود مضاعفات ، ويجب إبلاغ الجراح بذلك فوراً.

لا يمكن أن يكون هناك ضمان بنجاح أي جراحة. إن هدف الجراحة هو التحسين وليس الوصول إلى الكمال. المضاعفات تحدث ، وقد تكون هناك حاجة لعمليات لاحقة لتحسين النتائج. إن الهدف من الجراحة هو التحسين . الكمال قد لا يمكن إدراكه دائماً. قد تكون هناك حاجة لعمليات لاحقة لتحسين النتائج وخاصةً عند ظهور المضاعفات كما هو مذكور سابقاً.

2-التخدير الذي أتلقيه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير . اقرأ ورقة تعليمات التخدير المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3-ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشتمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Impaired circulation may occur to a limb or to an organ which may require further treatment.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Perfect symmetry between the two breasts cannot be guaranteed.
- There will be significant and obvious scars in the early months after the surgery, which will reduce with time.
- Occasionally scars may become very thickened, red and painful. These can be disfiguring.
- Sensation of the nipple may be affected. This can range from being complete loss through to mild reduction in sensation.
- Breakdown in the wound edges, particularly near the junctions of the up/down and crosswise scars. This is treated with regular dressings until healed.
- There will be swelling and the healing of the wound may be slow. It may spoil the intended result of the surgery.
- Infection. The wound becomes red and/or painful after discharge. This can lead to delay or complete failure of the healing process This may need treatment with antibiotics and further surgery to drain the infection. This may have

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبيير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين).
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- قد يحدث ضعف في الدورة الدموية في أحد الأطراف أو أعضاء الجسم مما قد يتطلب معالجة أخرى.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- لا يمكن ضمان حدوث التطابق والتماثل الكامل بين الثديين.
- ستكون هناك ندوب كبيرة وواضحة خلال الأشهر الأولى التي تعقب الجراحة والتي تقل مع مرور الوقت.
- أحياناً قد تصبح الندوب سمكة جداً ، حمراء اللون ومؤلمة. قد يسبب ذلك تشوهاً.
- قد يتأثر الإحساس في حلمة الثدي ويتراوح ذلك ما بين فقدان الكامل للإحساس إلى النقص البسيط في الإحساس.
- انفصال في جوانب الجرح وخاصةً بالقرب من مناطق التقاء الندب الممتد لأعلى وأسفل والندب العرضي. يعالج ذلك بالتضميد المنتظم حتى يحدث الالتئام.
- يحدث انتفاخ وتورم ، وقد يكون التئام الجرح بطيئاً. قد يفسد ذلك النتيجة المنتظرة من الجراحة.
- العدوى. يصبح الجرح أحمر اللون وأو مؤلم بعد خروج الإفرازات. قد يؤدي ذلك إلى تأخر أو الفشل الكلي لعملية الالتئام . قد يتطلب ذلك العلاج بالمضادات الحيوية وجراحة أخرى لتجفيف وتصريف العدوى . قد يسبب

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

an adverse outcome on the results of the surgery.

- Bleeding, causing collection of blood under the skin and breast tissue. This may need further surgery. There will be swelling and healing of the wound may be slow. It may spoil the intended result of the surgery.
- Some of the breast tissue may die due to poor circulation, more likely in patients with very large breasts and patients with very poor circulation. The size and shape may be altered in order to maintain an adequate circulation.
- Inability to breastfeed due to re-positioning of the nipples.

Notes to talk to my doctor about:

ذلك أثراً سلبياً على نتائج الجراحة.

- النزيف : قد يسبب النزيف تجمع للدم تحت الجلد و تحت نسيج الثدي . قد يتطلب ذلك جراحة أخرى . سيكون هناك انتفاخ وتورم ، وقد يكون التئام الجرح بطيئاً . قد يفسد ذلك النتيجة المنتظرة من الجراحة.
- قد يحدث موت لبعض من نسيج الثدي بسبب ضعف الدورة الدموية . يحدث ذلك غالباً عند المرضى الذين لديهم أنداء كبيرة جداً والمرضى الذين لديهم دورة دموية ضعيفة جداً . قد يتم تغيير حجم وشكل الثدي من أجل الحصول على تدفق دموي كافٍ.
- عدم القدرة على ممارسة الرضاعة الطبيعية بسبب تغيير موضع حلمة الثدي.

أمر أتناقش حولها مع طبيبي:
