

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent for Carotid Stenting

إقرار الموافقة على تركيب دعامة الشريان السباتي

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No

If Yes, is an interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The following will be performed. (Doctor/doctor delegate to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

A Carotid Stent is a procedure in which a small metal mesh tube is placed into the narrowed part of the carotid artery. It is used to stretch and open up the inside of the artery. The stent stays in for life. This procedure will require an injection of local anesthetic and the use of a sedation or general anesthetic.

C. Risks of this procedure

In recommending the Carotid Stenting, the doctor believes the benefits to you from having this procedure exceed the risks involved.

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.
- Pain or discomfort at the puncture site. This may require medication.
- Bleeding or bruising may occur. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- Low blood pressure and slow heart rate caused by pressure placed on nerves during stent insertion. This is only temporary and will resolve on its own once the pressure is released. Sometimes, drugs will be required to treat this.
- The artery can become narrowed or blocked again. This may require further treatment.
- Failure of local anaesthetic which may require a further injection of anaesthetic or a different method of anaesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.

Less common risks and complications include:

- Between 3 and 5 people in every 100 will have a stroke or stroke like complication due to the catheter causing damage to the artery. This can cause weakness in the face, arms and legs; it could be temporary or permanent.
- Infection, requiring antibiotics and further treatment.

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

الحاجة لخدمات الترجمة
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟
☐ نعم ☐ لا
☐ نعم ☐ لا

ب . الإجراء والعلاج

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب) منينوب عن الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء

تركيب دعامة الشريان السباتي هو إجراء يتم فيه وضع شبكة معدنية على شكل أنبوب يتم إدخالها في جزء الشريان السباتي الذي يعاني ضيقاً ، والغرض منها هو زيادة تمدد الشريان وفتح الجزء الداخلي منه .
تظل الدعامة في الجسد مدى الحياة .
سيطلب القيام بهذا الإجراء إعطائك حقنة مخدر موضعي واستخدام دواء مسكن أو تخدير كلي .

ج . مخاطر الإجراء

لقد أوصى طبيبك تركيب دعامة الشريان السباتي ، ويرى أن فوائد هذا الإجراء بالنسبة لك تفوق على مخاطره .
هناك مخاطر ومضاعفات مرتبطة بهذا الإجراء ، وهي تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

مخاطر ومضاعفات شائعة ، وتشمل:

- ألم بسيط ، كدمة و/أو عدوى عند منطقة دخول الإبرة الوريدية . قد يتطلب المعالجة بمضادات حيوية.
- ألم أو الشعور بعدم الراحة في منطقة دخول القسطرة . قد يتطلب ذلك المعالجة بالأدوية.
- حدوث نزيف أو كدمة . يحدث ذلك بشكل أكثر شيوعاً عند من يتناولون أدوية الوارفارين ، الأسبرين ، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن) .
- انخفاض في ضغط الدم وبطء في معدل ضربات القلب بسبب الضغط الذي تعرضت له الأعصاب أثناء إدخال الدعامة . يحدث ذلك بشكل مؤقت وتزول تلقائياً بمجرد رفع الضغط عن الأعصاب . أحياناً يتطلب علاج ذلك إعطاء أدوية.
- قد يضيق الشريان أو ينسد مرة أخرى ، وقد يتطلب ذلك المزيد من العلاج.
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى منه ، أو استخدام أسلوب تخدير آخر.
- ضرر لعصب . عادةً ما يكون ذلك مؤقتاً ، ومن المفترض تحسنه مع الوقت . من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.

مخاطر ومضاعفات أقل شيوعاً ، وتشمل:

- 3-5 مرضى من بين كل 100 مريض يحدث لديهم سكتة دماغية أو مضاعفات مشابهة لمضاعفات السكتة الدماغية بسبب الضرر الذي ألحقته القسطرة بالشريان . قد يسبب ذلك ضعفاً في الوجه ، الذراعين والساقين . قد يكون ذلك بشكل مؤقت أو دائم.
- عدوى تتطلب مضادات حيوية وعلاجات أخرى.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- A blood clot or excessive bleeding from the puncture site. This may require other treatment and/or corrective surgery.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- Rupture of a blood vessel requiring other procedures and/or corrective surgery.
- The stent may suddenly close. This may require further treatment.
- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Skin burns or damage from exposure to x-rays.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anaesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is very rare.

If sedation is given extra risks include:

- Faintness or dizziness, especially when you start to move around
- Fall in blood pressure
- Nausea and vomiting
- Weakness
- An existing medical condition getting worse
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia. This may require emergency treatment
- Stroke resulting in brain damage.

D. Risks of Iodinated Contrast for patients with renal impairment

Specific Risks of Iodinated Contrast to patient's identified as having Renal Impairment.

Giving the Contrast to people with weakened kidneys (renal impairment), can cause further kidney damage, which may in turn cause the kidneys to stop working properly (acute renal failure).

E. Patient Consent

I acknowledge that the doctor/doctor delegate has explained the proposed procedure.

I understand:

- The risks and complications, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor/doctor delegate or my Acute Resuscitation Plan.

- ضرر للأنسجة المحيطة كالأوعية الدموية ، الأعضاء الأخرى والعضلات وتتطلب معالجات أخرى.
- تخثر دموي أو نزيف مفرط من منطقة دخول القسطرة . قد يتطلب ذلك معالجات أخرى و/أو جراحة تصحيحية.
- رد فعل تحسسي لأي من الأدوية المعطاة . يتطلب ذلك علاجات أخرى.
- قد لا يكون القيام بالإجراء ممكناً لأسباب طبية و / أو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث ، وتشمل:

- تمزق لوعاء دموي مما قد يتطلب إجراء آخر وأو جراحة تصحيحية.
- قد يحدث انغلاق مفاجئ في الدعامة مما قد يتطلب معالجة أخرى.
- زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان خلال حياة المريض بسبب التعرض للأشعة السينية.
- حروق أو ضرر يصيب الجلد بسبب التعرض للأشعة السينية.
- تشنجات و/أو سكتة قلبية بسبب سمية المادة المستخدمة في التخدير الموضعي.
- الوفاة نادرة جداً كسبب لهذا الإجراء.

مخاطر إضافية في حالة استخدام دواء التخدير المسكن ، وتشمل:

- إغماءة أو دوخة ، خاصة عند البدء في الحركة بعد نهاية الإجراء.
- انخفاض في ضغط الدم .
- غثيان ، وتقيؤ.
- شعور بالضعف.
- تفاقم أي مرض آخر يعاني منه المريض.
- مشاكل في القلب والرئة كالآزمة القلبية أو دخول المادة المتبقية إلى الرئة مسببة التهاباً رئوياً. قد يتطلب ذلك تدخل علاجي طارئ.
- سكتة دماغية تسبب ضرراً للمخ.

د . مخاطر مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

المخاطر المحددة لمادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.
إعطاء مادة الوسط المتباين لمرضى يعانون من ضعف عمل الكلى قد يسبب أضراراً إضافية للكلى ، مما قد يسبب توقف الكلى عند العمل بشكل صحيح (فشل كلوي حاد).

هـ . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب\ من يوب عن الطبيب قد شرح لي الإجراء المقترح :
إنني على علم بما يلي :

- المخاطر والمضاعفات بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسين حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- A doctor/doctor delegate undergoing further training may conduct this procedure.

I have been given the following Patient Information Sheet:

☐ **Carotid Stenting**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.
- I understand that International Medical Center may release my relevant de-identified information obtained from this and related procedures for education and training of health professionals.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

F. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under:

- ☐ the Patient Consent section (E)
- ☐ Iodinated Contrast – Patients with Renal Impairment Section (D) (for renal impaired patients only).

And I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

☐ **تركيب دعامة الشريان السباتي**

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيع لي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.
- أن المركز الطبي الدولي قد يستخدم المعلومات الطبية المتحصلة من حالتي المرضية وفحوصاتي الطبية لأغراض التعليم والتدريب الطبي للممارسين الصحيين ، وذلك دون الكشف عن هويتي.

وبناء على ما تقدم، فإنني

أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

و . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً ضمن:

- ☐ قسم إقرار المريض (هـ)
- ☐ مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى (القسم "د") فقط للمرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

وأنتني أرى أن المريض \ من ينوب عن المريض في اتخاذ القرار قد فهموا جميع المعلومات المتعلقة.

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____