

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Oesophagectomy

استئصال المريء

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
An oesophagectomy is the removal of all or part of the food pipe (oesophagus) through an abdominal cut, a cut in the chest and/or a cut in the neck. The remaining food pipe will be joined to the stomach.

C. Risks of oesophagectomy

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Heart attack or stroke could occur due to the

أ. الترجمة / الاحتياجات اللغوية والثقافية

هل توجد حاجة لمترجم؟ ☐ نعم ☐ لا
في حال وجودها، هل هناك مترجم حاضر؟ ☐ نعم ☐ لا

ب. الحالة الطبية والعلاج

قام الطبيب بشرح حالتك الصحية كالآتي: (يقوم الطبيب بتوثيق الحالة الصحية كما وصفها المريض)

تتطلب الحالة الصحية العملية أو الإجراء التالي (يقوم الطبيب بالتوثيق - يتضمن الموقع و/أو الجانب المعنيين بالإجراء)

سيتم القيام بالإجراء الآتي:
عملية استئصال المريء هي عملية استئصال وإزالة جزئية أو كلية للمريء (أنبوب الطعام) عن طريق إجراء شق في البطن والصدر و/أو شق في الرقبة. سيتم إصصال ما تبقى من المريء بالمعدة.

ج. مخاطر استئصال المريء

هناك بعض المخاطر والمضاعفات المصاحبة لهذا الإجراء، وهي تشمل ولا تقتصر على ما يلي:

مخاطر عامة:

- التهاب، وقد يتطلب ذلك العلاج بالمضادات الحيوية وإجراءات علاج أخرى.
- قد يحدث نزيف ما قد يستلزم العودة لغرفة العمليات. ستكون أكثر عرضة للنزيف إذا كنت تتناول أدوية مضادة للتخثر مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفر)، أو ديبيري دامول (أساسانتين أو بيرسانتين).
- قد تصاب بنوبة قلبية أو جلطة نتيجة الضغط والجهد على القلب.
- حصول جلطة أو تخثر في الرجل (الإصابة بالخثار

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

strain on the heart.

- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Deep bleeding in the abdominal cavity could occur and this may need fluid replacement or further surgery.
- A very serious problem is a breakdown of the bowel anastomosis which causes leakage of stomach and duodenal secretions with very severe problems of infection in the chest and this can cause death.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- Damage of the bowel may occur which may cause leakage of bowel fluid. This may require further surgery.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after surgery and this may cause building up of fluid in the bowel with distention of the abdomen and vomiting. Further treatment may be necessary for this.
- A weakness can occur in the wound with complete or incomplete, bursting of the wound in the short term, or a hernia in the long term.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction.
- This can be a short term or a long term

الوريدي العميق) ما يسبب ألم وتورم، وفي حالات نادرة قد تنفصل الجلطة وتصل للرئتين

- قد تصاب أجزاء صغيرة من الرئة بالانسداد ما يزيد خطر الإصابة بالعدوى والالتهاب، ما قد يتطلب استخدام المضادات الحيوية والعلاج الفيزيائي الطبيعي.
- في المرضى المصابين بالسمنة، ترتفع نسبة الإصابة بالالتهاب في الجرح أو الرئة، والإصابة بمضاعفات في القلب والرئة أو الإصابة بالجلطة.
- الوفاة جرّاء هذا الإجراء أمر محتمل.

مخاطر خاصة بالإجراء:

- نزيف عميق في التجويف البطني، ما قد يتطلب إعطاء سوائل وجراحة إضافية.
- انهيار التفاغر المعوي ما يؤدي إلى تسرب إفرازات المعدة والاثنا عشر والتهابات صدر حادة ومهددة للحياة.
- التهابات كتجمعات قيح قد تتشكل في التجويف البطني ما قد يتطلب عملية تصريف جراحية.
- ضرر للأمعاء ما قد يؤدي إلى تسرب لسوائل الأمعاء. قد يتطلب ذلك جراحة إضافية.
- قد تصاب حركة الأمعاء بالكسل أو الانسداد ما سيؤدي إلى تجمع للسوائل مع انتفاخ للبطن وتقيؤ ما قد يستدعي لإجراءات علاج إضافية.
- ضعف يعترى الشق الجراحي ويؤدي على المدى القريب إلى تمزقه بشكل جزئي أو كامل ، وعلى المدى البعيد قد يتسبب ذلك في نشوء فتق.
- تشكل التصاقات (جرّاء الندبات) مسببة انسدادا للأمعاء.
- قد تكون هذه مضاعفة على المدى القصير أو المدى

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

complication and may need further surgery.

- There may be difficulty in swallowing after the operation. Usually treated with being stretched.
- There may be nutritional problems after the surgery e.g. anorexia, low iron, loss of weight and recurrent bilious vomiting.
- In some people healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red - a keloid scar and the wound may be painful.
- There may be a recurrence of the problem despite adequate surgery.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

الطويل، وقد يتطلب ذلك التدخل جراحي آخر.

- قد تكون هناك صعوبة في البلع بعد العملية، وعادة ما يتم علاج ذلك بالتوسيع.
- قد تظهر مشاكل غذائية بعد العملية ك فقدان الشهية ونقص في الوزن ونقص الحديد وتقيء صفراوي متكرر.
- قد يتعافى الجرح بصورة غيرطبيعية في بعض الأشخاص ما قد يؤدي لاحمرار وفتاق وألم في منطقة الجرح، وتشكل ندبات الجرح.
- قد تعود المشكلة للظهور مجدداً على الرغم من إجراء العملية على أكمل وجه.
- في المدخنين-ترتفع نسبة الإصابة بالالتهاب في الجرح والصدر، والإصابة بمضاعفات في القلب والرئة او الإصابة بالجلطة.
- د. المخاطر المعتبرة وخيارات الإجراء الطبي
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المساحة المخصصة، ويكمل في السجل الطبي إن لزم الأمر)

هـ. مخاطر عدم إجراء العملية

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المساحة المخصصة أدناه، ويكمل في السجل الطبي إن لزم الأمر)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

و. التخدير

قد تتطلب هذه العملية استخدام مخدر (يقوم الطبيب بتوثيق نوع المخدر الذي تم مناقشته)

ز. موافقة المريض

أقر بأن الطبيب قام بشرح ما يلي:

- حالتي المرضية والعملية المقترحة مع احتمالية ضرورة القيام بإجراء طبي أو عملية إضافية في حالة إن وجد الطبيب أمراً غير متوقع. أدرك تماماً مخاطر العملية بالإضافة إلى المخاطر التي تتعلق بحالتي وظروفي الشخصية.
- التخدير اللازم للعملية، مع إدراكي التام لمخاطر التخدير بالإضافة إلى المخاطر التي تتعلق بحالتي وظروفي الشخصية.
- إجراءات أو خيارات علاج أخرى، والمخاطر المرافقة لها.
- التشخيص لحالتي الطبية ومخاطر عدم إجراء العملية.
- عدم وجود ضمانات بتحسين حالتي بعد العملية على الرغم من أنها نفذت مع العناية المهنية الواجبة.
- قد تتضمن العملية إجراء عملية نقل الدم.
- قد يتم إزالة بعض الدم والأنسجة واستخدامها للتشخيص أو إدارة حالتي، وسيتم تخزينها والتخلص منها بحساسية من قبل المستشفى.
- سيتم معالجة أي حدث طارئ مهدد للحياة طبقاً لما تم مناقشته مع الطبيب أو طبقاً لخطة الإنعاش.
- قد يجري العملية طبيب غير الطبيب الاستشاري، وقد يكون الطبيب مازال قيد التدريب.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

☐ **About Your Anaesthetic**

☐ **Oesophagectomy**

☐ **Blood & Blood Products Transfusion**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Contact No:

H. Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

أقر بأني قد تلقيت نشرة المعلومات الصحية للمريض التالية:

التخدير وأنواعه ☐

استئصال المريء ☐

نقل الدم ومنتجات الدم ☐

• كنت قادراً على مناقشة وطرح كل تساؤلاتي

ومخاوفي على الطبيب بخصوص حالتي ومخاطر

الإجراءات والخيارات المتاحة لعلاجي، وأنا راض عن

الأجوبة التي تلقيتها.

• أنا على إدراك تام بحقي في تغيير رأيي في أي

وقت، حتى بعد توقيع هذه الاستمارة، ويفضل أن يكون بعد

مناقشة الطبيب.

• أنا أفهم بأنه قد يتم أخذ صور أو تسجيل فيديو

خلال العملية لمساعدة الطبيب على تقديم العلاج والإجراء

المناسبين.

• وعلى أساس البيانات المذكورة أعلاه...

أقر بموافقتي على تلقي العملية \ الإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

رقم التواصل:

المرضى الغير قادرين على تقديم الموافقة

يجب الحصول على الموافقة من الوكيل أو الوصي بالترتيب

أدناه.

اسم الوكيل\الوكلاء:

التوقيع:

صلة القرابة مع المريض:

التاريخ: الوقت:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

I. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

ح. بيان الطبيب/المندوب

أقرّ بأنّي قمت بشرح جميع النقاط تحت قسم موافقة المريض (ز) للمريض، ورأيي أن المريض/المنيب عنه قد فهم جميع المعلومات.

اسم الطبيب/المندوب:

المنصب:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

1) الاسم: لتاريخ:

التوقيع: الوقت:

2) الاسم: التاريخ:

التوقيع: الوقت: