

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient Copy Eyelid Surgery (Blepharoplasty)

معلومات الإقرار – نسخة المريض الجراحة التجميلية لإصلاح جفن العين

1. What do I need to know about this procedure?

Blepharoplasty is a procedure that removes fat deposits, excess skin, or muscle usually from both the upper and lower eyelids. This improves the appearance of the eyes and/or improves the range of vision of the patient.

Important Information

Before the operation, you must tell the surgeon performing the operation and the anaesthetist of:

- any medical problems
- any allergies
- prescribed drugs (particularly blood thinning drugs such as Aspirin or Warfarin)
- your use of recreational drugs
- your alcohol consumption
- your use of herbal remedies

Any drugs containing Aspirin or similar compounds should be stopped prior to surgery as these increase the risk of bleeding and, therefore, haematoma formation.

Immediately after the operation, you should avoid over-activity and bending over for up to three weeks. Dark glasses are also helpful in the immediate post-operative period.

The upper eyelid is usually slightly 'overdone' in order to attain a much better long-term cosmetic result. This may result in the upper eyelid becoming slightly opened when asleep. This may persist for some weeks. Should this occur, it is vital that you use a lubricating eye ointment during this phase in order to prevent your eye

1- ما الذي ينبغي علي معرفته عن هذا الإجراء؟
الجراحة التجميلية لإصلاح جفن العين هي إجراء يتم فيه إزالة تراكومات الدهن ، الجلد الزائد أو عضلة عادةً من كلا الجفنين العلوي والسفلي. يؤدي ذلك إلى تحسين مظهر العينين و \ أو تحسين مجال الرؤية عند المريض.

معلومات هامة

قبل العملية يجب إبلاغ الجراح وطبيب التخدير المسؤولين عن حالتك بالتالي:

- أي مشاكل صحية يعاني منها المريض
- أي نوع من أنواع الحساسية
- الأدوية الموصوفة التي يتناولها المريض (بالأخص الأدوية المسببة لزيادة سيولة الدم كالأسبرين والوارفرين)
- استخدام المريض لأي نوع من أنواع المخدرات أو العقاقير الترفيهية
- احتساء المريض للكحوليات
- استخدام المريض للعلاجات العشبية.

يجب قبل الخضوع للجراحة التوقف عن تناول أي دواء يحتوي الأسبرين أو أي مركبات مشابهة لأنها تزيد من خطر النزيف مما قد يسبب التورم الدموي.

مباشرة بعد العملية ، على المريض تجنب النشاط المفرط والانحناء لمدة تصل إلى الثلاثة أسابيع ، كما أن استخدام النظارات الدائنة (الشمسية) مفيد في الفترة التي تعقب الجراحة مباشرة.

عادةً ما يتم إصلاح الجفن العلوي بشكل مبالغ فيه قليلاً للحصول على نتائج تجميلية أفضل على المدى البعيد. قد يؤدي ذلك إلى بقاء الجفن العلوي مفتوحاً بعض الشيء أثناء النوم. قد يستمر ذلك لبضعة أسابيع ، وإذا حدث ذلك فإنه من المهم جداً استخدام المريض لمرهم مرطب للعين خلال هذه الفترة لتجنب جفاف

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

from drying out and becoming sore. If any post-operative pain develops, and/ or persists, the surgeon must be told, as this may a sign of a complication.
Improvement is the aim of cosmetic surgery and not perfection. Further operations may be required to improve the overall result.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthesia OR Local Anaesthesia & Sedation for Your Procedure information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor. If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Impaired circulation may occur to a limb or to an organ which may require further treatment.
- Death or brain damage as a result of this

وتقرح العين.

عند ظهور أي ألم بعد الجراحة أو طال بقاءه ، فيجب إبلاغ الجراح ، حيث أن ذلك قد يكون علامة لحدوث مضاعفات. إن هدف الجراحة التجميلية هو تحسين المظهر وليس الوصول إلى الكمال. قد تكون هناك حاجة لعمليات لاحقة لتحسين المظهر النهائي بشكل شامل.

2-التخدير الذي أتلقيه

هذا الإجراء يتطلب الخضوع للتخدير.

اقرأ ورقة تعليمات التخدير المقدم لك أو التخدير الموضعي والدواء المسكن المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

1. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار داباييردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- قد يحدث ضعف في الدورة الدموية في أحد الأطراف أو أعضاء الجسم مما قد يتطلب معالجة أخرى.
- الوفاة أو حدوث ضرر للمخ محتمل كنتيجة لهذا الإجراء.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

procedure are possible.

Specific risks:

- The scar may be pink and slightly thickened. in the first few weeks after surgery, and more so in the lower eyelid. This may require make-up camouflage until it settles.
- Bruising around the eyelids which may spread to the white part of the eye where it may remain for a week to 10 days.
- The upper eyelid may slightly open when asleep. This may persist for some weeks. As a result the tissue at the front of the eye can dry out and cause scarring, which will reduce the quality of eyesight. Long term problems with tear formation or dry eye may also result. This requires the use of artificial tears.
- Ectropion, where the lower eyelid appears pulled down too far. The skin below the lower eyelid may not be as smooth as desired.
- Weakness of the lower lid, for up to two weeks. This usually settles without treatment, but may require further surgery.
- Formation of small lumps in the lower eyelid. These generally disappear over a few months. During this time, there may be temporary corneal irritation and abrasions.
- Excessive tear formation and sensitivity to bright light for the first few days.
- Blurring of vision, due to swelling and use of ointment in the eye.
- Double vision, which may last for a day or two after the operation. This usually recovers spontaneously and is a result of the bruising.
- Wound infection, bruising and fluid collecting under the skin. This may require drainage of any tissue fluid that is infected or accumulated under the skin. This may delay the speed of wound healing and may cause disfigurement.
- Blindness. This is an extremely remote and rare possibility.

مخاطر محددة:

- قد يكون الندب الجراحي وردي اللون وسميكاً بعض الشيء خلال الأسابيع الأولى التي تعقب الجراحة وخاصةً في الجفن السفلي. قد يتطلب ذلك استخدام مستحضرات تجميل لتمويهه وإخفاءه حتى يحدث الشفاي.
- حدوث كدمة حول الجفن وقد تنتشر لتصل إلى بياض العين حيث يستغرق بقاء ذلك من 7-10 أيام.
- قد يكون الجفن العلوي مفتوحاً بعض الشيء أثناء النوم. قد يستمر ذلك لعدة أسابيع ، وبسبب ذلك فقد يجف النسيج الموجود في مقدمة العين وقد يحدث فيه تندب. يؤثر ذلك سلباً في جودة البصر . قد تحدث أيضاً على المدى الطويل مشكلة في تكوّن الدمع وجفاف العين. يتطلب ذلك استخدام الدموع الصناعية.
- تدلي الجفن السفلي للأسفل بعيداً عن العين. قد لا يكون الجلد الموجود أسفل الجفن السفلي بدرجة النعومة المرغوبة.
- ضعف في الجفن السفلي لفترة تستمر حوالي الأسبوعين. غالباً ما يتعافى ذلك دون الحاجة لعلاج ، ولكنه قد يتطلب جراحة أخرى.
- نشوء كتل صغيرة في الجفن السفلي . عادةً ما تختفي خلال عدة أشهر. خلال هذه الفترة قد يحدث تهيج مؤقت أو خدوش مؤقتة في القرنية.
- فرط إنتاج الدمع وحساسية للأضواء المتوهجة خلال الأيام الأولى التي تعقب الإجراء.
- ضبابية في النظر بسبب التورم واستخدام مرهم العين.
- الرؤية المزدوجة. قد تستمر ليوم أو يومين بعد الجراحة. غالباً ما يتعافى ذلك بشكل تلقائي وهو نتيجة للكدمة.
- عدوى الجرح ، كدمة و تجمع للسوائل تحت الجلد . قد يتطلب ذلك سحب وتصريف لأي سائل داخل الأنسجة بها عدوى أو متجمعة تحت الجلد. قد يؤثر ذلك في سرعة التئام الجرح وقد يسبب تشوه.
- الإصابة بالعمى من المضاعفات المحتملة النادرة والمستبعد جداً حدوثها.



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Notes to talk to my doctor about:

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
