

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Femoropopliteal Bypass

معلومات الإقرار - نسخة المريض تحويل مسار الدم (التحويل الفخذية المأبضية)

1. What do I need to know about this procedure?

Femoropopliteal bypass surgery is used to by-pass diseased blood vessels above and below the knee. To bypass the blocked blood vessel, blood is re-directed through either a healthy blood vessel that has been transplanted or man-made graft material. This graft or vessel is sewn above and below the diseased artery so that blood flows through the new vessel or graft. The aim is to improve the circulation.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.
If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and

1. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟
تجرى جراحة التحويل الفخذية المأبضية لتجاوز الأوعية الدموية المريضة أعلى وأسفل الركبة .
لتجاوز الوعاء الدموي المسدود ، يتم إعادة توجيه مسار الدم عن طريق إما وعاء دموي سليم تمت زراعته ، أو عن طريق رقعة من مادة صناعية . تتم خياطة هذا الوعاء الدموي أو الرقعة الصناعية أعلى وأسفل الجزء المريض من الشريان المريض بحيث يجري الدم عبر الوعاء الدموي أو الرقعة الجديدة. الهدف من الإجراء هو تحسين الدورة الدموية.

التخدير الذي أتلّقه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ ورقة معلومات التخدير المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

thrombosis.

- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The graft may block and not improve the circulation or make the circulation worse. The leg below may develop signs of lack of blood supply and further surgery may be necessary, which may be amputation.
- Infection in the wounds is common because of poor blood supply to the area. This may require antibiotic therapy and long term wound care.
- There may be loss of limb.
- The groin wounds may discharge clear fluid called lymph for some time. This usually settles but may require further surgery (this is rare).
- Healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red (a keloid scar) and the scar may be painful.
- Rarely a leak may occur from the graft where it is sutured to the blood vessel, and it may form a lump called a false aneurysm. This may require further surgery.
- The leg usually swells after the surgery. This is usually temporary and not related to the arteries. You may need to wear a compression stocking.
- There may be nerve injury, which can cause heightened sensitivity and/or numbness in parts of the leg and foot. This is usually permanent.
- A synthetic graft may be used if my own vein is not useable.
- The synthetic graft may become infected. If the synthetic graft becomes infected it will need to be removed. This may result in limb loss.

بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.

- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد يفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- قد يحدث انسداد في الرقعة مما قد لا يحسن الدورة الدموية ، بل قد يزيدها سوءاً. الجزء السفلي من الساق قد تظهر عليه أعراض نقص التروية الدموية ، وقد تكون هناك ضرورة لجراحة أخرى والتي قد تكون إجراء عملية بتر.
- من الشائع حدوث عدوى للجروح بسبب ضعف التروية الدموية للمنطقة. قد يتطلب ذلك العلاج بالمضادات الحيوية وعناية طويلة الأمد بالجرح.
- قد يكون هناك فقدان للطرف الذي تتم فيه الجراحة.
- قد تخرج من الجروح في منطقة أعلى الفخذ إفرازات سائلة لونها صاف تسمى الليمف (اللمف). يحدث ذلك لبعض الوقت. عادةً ما يختفي ذلك ، إلا أنه وفي حالات نادرة قد يتطلب جراحة أخرى.
- قد يلتئم الجرح بطريقة غير طبيعية ، وقد تزداد سماكة الجرح ويصبح أحمر اللون (تكون ندبة الجذرة: وهي تليف للجلد يعقب الجروح) وقد تكون مؤلمة.
- نادراً ما يحدث تسريب من الرقعة في المنطقة التي تمت فيها خياطة الرقعة بالوعاء الدموي ، وقد تؤدي إلى تكون نتوء (كتلة) تعرف بالـ (الانتفاخ أو التمدد الكاذب). قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- تتورم عادةً الساق بعد الجراحة ويكون ذلك لفترة مؤقتة وليس له علاقة بالشرابين. قد يضطر المريض للبس جوارب ضاغطة .
- قد تحدث إصابة لأحد الأعصاب مسببة زيادة في الإحساس وأو خدر في مناطق من الساق والقدم. عادةً ما يكون ذلك بشكل دائم.
- تستخدم الرقعة الصناعية إذا كان وريد المريض غير قابل للاستخدام كرقعة.
- قد تحدث عدوى في الرقعة الصناعية ، وعند حدوث ذلك سوف تكون هناك ضرورة لإزالتها. قد يؤدي ذلك إلى فقدان الطرف الذي خضع للجراحة.



DoB: _____

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:

[illegible][illegible]