

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Parent/Patient Copy Hernia – Inguinal Repair Child/Young Person

الفتق-إصلاح الفتق الإربي الطفل/صغير السن
معلومات الإقرار – نسخة والد المريض/المريض

1. What do I need to know about this procedure?

Open surgery to repair the weakness in the groin area. A small cut is made at the site of the hernia.

2. My Anaesthetic.

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Child's Anaesthetic** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin or aspirin.
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Impaired circulation may occur to a limb or to an organ which may require further treatment.

Specific risks:

- Rarely the hernia may come back. The risks are about 1 in 100 children to 7 in 100 children for hernias on one or both sides, and higher for hernias that have come back.
- In male children, the testicle and also the

1. ما الذي يجب أن أعرفه عن هذا الإجراء؟

هي جراحة عن طريق الفتق لإصلاح موضع الضعف في منطقة أعلى الفخذ. يتم عمل شق جراحي صغير في موضع الفتق.

2. التخدير الذي أتلقيه

قد يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير. اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لطفلك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يحدث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين.
- قد يحدث إنغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- انخفاض تدفق الدم لأحد أعضاء أو أطراف الجسم والذي قد يتطلب معالجات أخرى.

مخاطر متعلقة بهذا الإجراء بالتحديد:

- نادراً ما يعود الفتق للظهور. معدل الخطر هو 1 من كل 100 طفل إلى 7 من كل 100 طفل إذا كان الفتق في جانب واحد أو في الجانبين ، ويكون معدل عودة الظهور أكبر في الفتق المتكررة.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

contents of the scrotum may swell due to tissue damage or bleeding, also the penis may show bruising. This should settle in time.

- The testicle may sit a little higher in the scrotum after the operation.
- In some children, healing of the wound may be abnormal. The wound can be thickened and red and the wound may be painful.
- Rarely in emergency hernia repairs, there may be bowel injury due to strangulation of the bowel in the hernia. The testicle may no longer work and shrink.
- Herniae that come back are more prone to the complications as stated above.

Notes to talk to my doctor about:

- عند الأطفال الذكور قد تتورم الخصية ومكونات كيس الخصية المحيط بها بسبب ضرر حدث للأنسجة أو بسبب النزيف. قد يصاب العضو الذكري بكدمات، ويتعافى ذلك مع الوقت.
- بعد الجراحة، قد تأخذ الخصية موقع أعلى من موقعها السابق داخل كيس الخصية.
- عند بعض الأطفال قد يلتئم الجرح بشكل غير طبيعي، فقد تزداد سماكة الندب الجراحي ويصبح لونه أحمر وقد يكون مؤلماً.
- نادراً، وفي الحالات الطارئة لإصلاح الفتق، قد يحدث ضرر للأمعاء بسبب اختناق الأمعاء داخل الفتق. قد لا تعمل الخصية بعد ذلك ويحدث لها انكماش.
- الفتق المتكرر أكثر عرضة لحدوث المضاعفات كما هو مذكور آنفاً.

أمور أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
