

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Lipectomy (Apronectomy)

معلومات الإقرار – نسخة المريض استئصال الشحم

1. What do I need to know about this procedure?

A Lipectomy (Apronectomy) is the surgical removal of an apron of fatty tissue from the abdomen. The wound will be closed with staples and/or stitches.

2. My Anaesthetic.

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor. If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.

1. ما الذي ينبغي أن أعرفه عن هذا الإجراء؟

في هذا الإجراء تتم عملية الاستئصال الجراحي لطبقة من الأنسجة الدهنية (الشحم) من البطن. يتم إغلاق جرح العملية بالتدبيس الجراحي و/ أو الغرز الجراحية.

2. التخدير الذي أتلقيه

قد يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير. اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يعقب أخذ العينة حدوث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- قد يحدث انهيار في مناطق صغيرة في الرئة، ازدياد المخاطرة في التهاب الصدر. قد تحتاج الى ادوية مضادات حيوية و علاج طبيعى.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة قد تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهابات الجرح، والتهاب الصدر، مضاعفات في القلب والرئة مع تجلطات.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- A large area of skin has to be surgically opened to remove the fatty tissue.
- Drains need to be placed and these may discharge fluid for some time.
- After removal of the drains fluid or blood may build up under the skin flaps and this may need to be removed.
- The final scar may have a thickened or discoloured appearance and be painful.
- The ends of the longer scar may be prominent and cause some discomfort.

Notes to talk to my doctor about:

- يمكن أن تحدث أزمة قلبية أو سكتة دماغية بسبب الضغط الواقع على القلب.
- تجلط الدم في القدم (تجلط الاوردة العميقة) يؤدي الى الم وانتفاخ. في حالات نادرة من التجلط قد يحدث قطع لجزء من الجلطة وتنتقل الى الرئة.
- يمكن حدوث وفاة كنتيجة لهذا الإجراء

مخاطر خاصة بهذا الإجراء:

- الحاجة للفتح الجراحي لجزء كبير من الجلد لإزالة النسيج الدهني.
- الحاجة لوضع أنابيب لسحب وتصريف السوائل المتجمعة وقد يستمر ذلك لبعض الوقت.
- بعد إزالة أنابيب سحب السوائل ، قد تتجمع السوائل مرة أخرى أو الدم تحت الجلد المنقول لتغطية موضع العملية ، مما قد يتطلب سحبها .
- الندب النهائي الناتج عن العملية قد تزداد سماكته ويتغير لونه ومظهره ، ويكون مؤلماً.
- إذا كان الجرح كبيراً ، فإن أطرافه قد تكون بارزة وتسبب شيء من عدم الراحة.

أمر أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
