

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Parent/Patient Copy Orchidopexy – Repair of Undescended Testicle Child/Young Person

معلومات الإقرار – نسخة والد المريض/المريض
إصلاح وتثبيت الخصية/الخصيتين المعلقة في
وعاء الخصيتين (الطفل/صغير السن)

1. What do I need to know about this procedure?

Local and surgical repair of the undescended testicle/s to as near normal a position as possible.

2. My Anaesthetic.

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Child's Anaesthetic** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur which may require treatment including antibiotics.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin or Aspirin.
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Impaired circulation may occur to a limb or to an organ which may require further treatment.
- Death or brain damage as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The testicle may not be able to be placed in its

1. ما الذي ينبغي علي معرفته عن هذا الإجراء؟
إيجاد الخصية/الخصيتين المعلقة ، و الإصلاح الجراحي إلى أكثر الأماكن قرباً من موقعهما الطبيعي المفترض.

2. التخدير الذي أتلقيه

قد يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لطفلك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة.
إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في

3. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟
هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين .
- قد يحدث إنغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- انخفاض تدفق الدم لأحد أعضاء أو أطراف الجسم والذي قد يتطلب معالجات أخرى.
- الوفاة أو تضرر المخ محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة متعلقة بهذا الإجراء:

- قد لا يتم التمكن من وضع الخصية في مكانها الصحيح وقد يتطلب ذلك جراحة أخرى.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

correct position and further surgery may be necessary.

- A hernia may be found and will need to be repaired.
- There may be considerable swelling and bruising in the scrotum (this will go with time).
- Rarely, the testicle may shrink in size and lose function.
- In rare circumstances, the testicle may need to be removed.
- If the testicle cannot be found in the groin, it may be necessary to look inside the abdomen.

Notes to talk to my doctor about:

- قد يكتشف وجود فتق ويحتاج ذلك للإصلاح.
- قد يحدث تورم كبير وكدمة كبيرة في وعاء (كيس) الخصيتين (يتعافى ذلك مع الوقت).
- من النادر أن يحدث انكماش في الخصية وتفقد وظيفتها.
- في ظروف نادرة ، قد يتطلب الأمر إزالة الخصية.
- إذا لم يتم إيجاد الخصية في منطقة أعلى الفخذ ، قد يكون من الضروري البحث عنها داخل البطن.

أمور أتناقش حولها مع الطبيب:
