

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Pancreatitis - Operation for Acute Necrotizing Pancreatitis

معلومات الإقرار – نسخة المريض
التهاب البنكرياس-جراحة علاج التهاب البنكرياس الناجم عن الحاد

1. What is an operation for acute necrotizing pancreatitis?

The procedure will involve the removal of gangrene and infection from the pancreas gland which may require partial removal of the gland itself. Further operations may be needed to remove all the diseased tissue, which may be over a 2-3 week period.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound

1. ما هي جراحة علاج التهاب البنكرياس الناجم عن الحاد؟
في هذا الإجراء تتم إزالة الأجزاء المصابة بالغرغرينة (الميتة) والمصابة بالتهاب من غدة البنكرياس و هو الإجراء الذي قد يتطلب استئصال كامل الغدة أو جزء منها.
قد تكون هناك حاجة لعمليات جراحية أخرى لإزالة كل النسيج المريض وذلك في غضون 2-3 أسابيع.

2. التخدير الذي أتلناه
سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .

اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟
هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايابير دامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- قد يحدث إنسداد للشعب الهوائية الصغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.

- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Pancreatitis can be a life threatening condition. Formation of pancreatic fistula with pancreatic juice leaking onto abdominal wall. This may take some weeks to seal across and may cause skin irritation.
- The pancreatic tissue and surrounds may be severely damaged and become dead tissue, and extensive tissue removal may be necessary.
- Patient may develop a hernia and may require skin grafting to close the abdomen. This may cause scarring and permanent disfigurement.
- Damage of the bowel may occur which may cause leakage of bowel fluid. This may require further Surgery
- The abdominal wound may have to be left open to allow adequate drainage.
- Deep bleeding in the abdominal cavity could occur and this may need fluid replacement or further surgery.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after surgery and this may cause building up of fluid in the bowel with distension of the abdomen and vomiting. Further treatment may be necessary for this.
- A weakness can occur in the wound with complete or incomplete, bursting of the wound in the short term, or a hernia in the long term. This may require further surgery.

بالتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية

- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر متعلقة بهذا الإجراء:

- قد يكون التهاب البنكرياس من الحالات المرضية المهددة للحياة . تكون ناسور البنكرياس وتسرب عصارة البنكرياس على الجدار البطني قد يستغرق أسابيع ليغلق بإحكام وقد يسبب تهيج للجلد.
- نسيج البنكرياس والأجزاء المحيطة به قد تتعرض لضرر شديد وقد تصبح أنسجة ميتة . قد تكون هناك حاجة لإزالة واسعة للأنسجة.
- قد يظهر عند المريض فتق وقد يحتاج جراحة ترقيعية للجدار لإغلاق البطن. قد يسبب ذلك ندباً وتشوها دائماً.
- ضرر يصيب الأمعاء مسبباً تسرب لسوائل الأمعاء ، مما قد يتطلب جراحة أخرى .
- قد تكون هناك حاجة لترك جرح البطن مفتوحاً للسماح بالتصريف الكافي للسوائل.
- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- الإصابة بعدوى كتجمعات للصدید في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصدید جراحياً .
- قد تصاب حركة الأمعاء بالانسداد أو بطء الحركة بعد العملية مما يسبب تراكم السوائل في الأمعاء وانتفاخ للبطن وتقيؤ. قد يتطلب الأمر علاج آخر.
- ضعف قد يعترى الجرح ويؤدي على المدى القريب إلى تمزقه بشكل جزئي أو كامل ، وعلى المدى البعيد قد يتسبب ذلك في نشوء فتق. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- In some people healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red and the wound may be painful.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long-term complication and may need further surgery.
- Recurrent severe pain can occur if the acute problem goes into a chronic phase.
- Long term problems can occur due to damage to his pancreas, e.g. diabetes mellitus, malabsorption of essential nutrients.

Notes to talk to my doctor about:

- عند بعض المرضى ، قد لا يلتئم الجرح بشكل طبيعي . قد تزداد سماكته ويصبح لونه أحمر ، وقد يكون مؤلماً.
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.
- إذا دخل الالتهاب الحاد إلى المرحلة المزمنة ، فقد يعاني المريض من الأم شديدة متكررة.
- ظهور مشاكل طويلة الأمد بسبب تضرر البنكرياس كالسكري ، عدم اكتمال امتصاص العناصر الغذائية الضرورية.

أمر أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
