

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Pancreatoduodenectomy (Whipples Operation) Pancreatic Resection

معلومات الإقرار – نسخة المريض
استئصال البنكرياس و الإثنى عشر (عملية وييل
استئصال كامل أو جزء من البنكرياس

1. What is a pancreatoduodenectomy (Whipples operation)?

This procedure is where the removal of part of the intestine pancreas (the gland that supplies digestive juices to the part of the intestine and bile ducts) to remove a possible tumour is done.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.

1. ما هو استئصال البنكرياس و الإثنى عشر (عملية وييل) ؟
في هذه الجراحة يتم استئصال جزء من الأمعاء (البنكرياس وهو غدة تنقل العصارة الهضمية لجزء من الأمعاء والقنوات المرارية) لإزالة ورم محتمل.

2. التخدير الذي أتلقيه
سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.

إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟
هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دابايردامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- قد يحدث انسداد للشعب الهوائية الصغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The most serious problem is leakage of pancreatic, bile or gastric juices into the abdominal cavity, due to breakdown of the anastomosis. This may require further surgery or prolonged period of IV feeding. Especially in a male there may be difficulty passing urine and a tube may need to be inserted into the bladder.
- Deep bleeding in the abdominal cavity. This may need fluid replacement or further surgery.
- Damage of the bowel, which may cause leakage of bowel fluid. This may require further surgery. Infections such as pus collections in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after surgery and this may cause building up of fluid in the bowel with bloating of the abdomen and vomiting. Further treatment may be necessary for this.
- A weakness in the wound with complete or incomplete, bursting of the wound in the short term, or a hernia in the long term. This may require further surgery.
- In some people healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and the wound may be painful.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long term complication and may need

• قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.

- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر متعلقة بهذا الإجراء:

- إن أخطر المشاكل هي تسرب عصارة البنكرياس ، مادة الكبد الصفراء أو العصارة المعدية إلى التجويف البطني بسبب تمزق التوصيلة (الوصلات الموجودة بين القنوات المتجاورة). قد يتطلب ذلك جراحة أخرى أو البقاء لفترة طويلة على التغذية الوريدية.

• عند الرجال على وجه الخصوص ، قد تكون هناك صعوبة في إدرار البول بعد الجراحة ، مما قد يتطلب وضع أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة .

- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.

- ضرر يصيب الأمعاء مسبباً تسرب لسوائل الأمعاء ، مما قد يتطلب جراحة أخرى .

• الإصابة بالتهاب سائل البطن كتجمعات للصديد في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصديد جراحياً .

- قد تصاب حركة الأمعاء بالانسداد أو بطء الحركة بعد العملية مما يسبب تراكم السوائل في الأمعاء وانتفاخ للبطن وتقيد. قد يتطلب الأمر علاج آخر.

• ضعف قد يعترى الجرح ويؤدي على المدى القريب إلى تمزقه بشكل جزئي أو كامل ، وعلى المدى البعيد قد يتسبب ذلك في نشوء فتق. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.

- عند بعض المرضى ، قد لا يلتئم الجرح بشكل طبيعي . قد تزداد سماكته و يكون مؤلماً.

• قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

further surgery.

- Unusual feeling after meals called 'dumping'. Nutritional problems such as weight loss, or anorexia due to removal of part of the stomach.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

Notes to talk to my doctor about:

- "الإغراق" و هو شعور غير معتاد بعد تناول الطعام بسبب الانتقال السريع لمحتويات المعدة غير المهضومة إلى الأمعاء.
- مشكلات غذائية مثل فقدان الوزن ، أو فقدان الشهية بسبب استئصال جزء من المعدة.
- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.

أُمور أقوم مناقشتها مع طبيبي المعالج
