

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Abdominoplasty

جراحة شد البطن

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure.
(Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
This procedure is where a long cut is made across (horizontally) the lower abdomen. Skin and fat will be stripped off the muscles all the way from the pelvis to the rib cage. Skin is then pulled down and excess skin and fat is removed.
This will leave a long, low scar passing out from the centre above the pubic hair out sideways onto each hip. The umbilicus (belly button) will be brought out through a separate opening leaving a small scar which will be as hidden as possible.

C. Risks of an abdominoplasty

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة بنعم، فهل يتوفر مترجم حاضراً؟ ☐ نعم ☐ لا

ب. الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من: (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي:
في هذا الإجراء يتم عمل شق جراحي أفقي (بالعرض) طويلاً أسفل البطن. يتم نزع الجلد وطبقة الدهون من العضلات في كامل المنطقة من الحوض إلى القفص الصدري. يتم بعد ذلك سحب الجلد للأسفل حيث يزال الجلد والدهن الفائض. يترك ذلك ندباً طويلاً منخفضاً يمتد من منتصف منطقة أعلى شعر العانة باتجاه عظمة الحوض في الجانبين. يتم إخراج سرة البطن عبر فتحة مستقلة مما يترك ندباً صغيراً يتم إخفاؤه قدر الإمكان.

ج. مخاطر جراحة شد البطن

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات، وهي تشمل، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).

- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

Scars

- A long, horizontal (across) scar, which is noticeable but usually fades in time.
- Sometimes the scars can be red, thick and itchy.
- The pubic hairline may be pulled out towards the hipbones by about 2cm.

Failure of the procedure

- A scar like an upside-down T, or occasionally two scars, a horizontal (crosswise) one and a transverse (up and down) scar.
- Necrosis (dying) of remaining skin due to poor circulation where there is scar tissue.
- Rarely, necrosis (death of skin) near previous surgical scars.

Position of umbilicus (belly button).

- The umbilicus may not be central.
- Loss of the umbilicus. The scar may provide a reasonable substitute.

العمليات لإيقافه حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار داياباير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين).

- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر، مضاعفات في القلب والرئة، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر متعلقة بهذا الإجراء:

الندوب الجراحية

- ينتج عن الجراحة ندب جراحي طويل ومستعرض (أفقي). يكون الندب مرئياً إلا أنه يبهت ويتلاشى مع مرور الوقت.
- أحياناً يكون الندب أحمر اللون، سميك ويسبب الحكة.
- قد يتم سحب شعر العانة باتجاه عظمي الحوض بحدود 2 سنتيمتر.

فشل الإجراء

- ندب جراحي على شكل حرف (T) المقلوب، أو أحياناً ندين جراحيين أحدهما أفقي بالعرض وآخر طولي.
- موت باقي الجلد بسبب ضعف الدورة الدموية في النسيج المتندب.
- من النادر حدوث موت الجلد بالقرب من ندوب جراحية سابقة.

موضع سرّة البطن

- قد لا يكون من الممكن وضع سرّة البطن في المنتصف.
- فقدان سرّة البطن. قد يوفر الندب الجراحي بديلاً معقولاً.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Abdominal wall muscles

- Muscle soreness immediately after operation.

Sensory changes

- Numbness of skin pulled down below the umbilicus for up to a year or so.
- There may be numbness on each side.

Complications

- Increased risk of clots in the leg for patients who are on the oral contraceptive pill. Part of this clot may break off and go to the lungs, which can be fatal.
- Collection of fluid under the skin above the horizontal scar.
- Marked increase of failure of the procedure due to effects of smoking on quality of blood supply to the skin of the lower part of the abdominal wall.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed).

عضلات جدار البطن

- يشعر المريض بألم مباشرة بعد العملية.

تغيرات في الإحساس

- خدر في الجلد الذي تم سحبه للأسفل من تحت سرة البطن. يستمر ذلك لما يقارب السنة.
- قد يكون هناك خدر في الجانبين.

المضاعفات

- زيادة خطر الإصابة بجلطة في الساق عند السيدات اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل عن طريق الفم. قد ينفصل جزء من هذا التجلط ويصل إلى الرئة. قد يكون ذلك مميتاً.
- تجمع دموي تحت الجلد فوق الندب الأفقي.
- تكون هناك نسبة عالية باحتمال فشل الإجراء بسبب تأثير التخدير على جودة تدفق الدم إلى الجلد في منطقة أسفل جدار البطن.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ About Your Anaesthetic
- ☐ Abdominoplasty

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed investigation and its risks, and my treatment options. My questions and concerns

ز . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

- ☐ نوعية التخدير المقدم لي
- ☐ جراحة شد البطن

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

have been discussed and answered to my satisfaction.

- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my investigation and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار :

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ : الوقت:

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب
لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____