

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent for Cerebral Vasospasm Treatment

إقرار الموافقة على علاج انقباض الأوعية الدموية في المخ

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required?

☐ Yes ☐ No

If Yes, is an interpreter present?

☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The following will be performed. (Doctor/doctor delegate to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

Treatment for cerebral vasospasm includes injecting medication directly into the narrowed blood vessels. This medication opens up the blood vessels.

Repeated cerebral injections may be required until the vasospasm settles. Sometimes, a special balloon may be inflated into the narrowed blood vessel to help open it up and improve the blood flow. Your doctor will choose the best treatment method suited to your condition.

Treatment is performed as an extra step to an angiogram procedure. This procedure will require an injection of local anesthetic and may require the use of a sedation or general anesthetic.

C. Risks of this procedure

In recommending the Cerebral Injection for vasospasm, the doctor believes the benefits to you from having this procedure exceed the risks involved. The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Rare risks and complications of the medication used include:

- Low blood pressure, which may require treatment with medications.
- Build up of pressure in the fluid around the brain requiring a temporary drain to be inserted.

Common risks and complications of the actual procedure include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.
- Pain or discomfort at the puncture site. This may require medication.
- Bleeding or bruising may occur. This is usually stopped by applying pressure and/or ice to the puncture site. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- Failure of local anesthetic which may require a further

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد خدمة الترجمة؟
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟
نعم لا
نعم لا

ب. الإجراء والعلاج

تتطلب هذه الحالة المراضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب\ من ينوب عن الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

علاج انقباض الأوعية الدموية في المخ يشمل حقن مباشر للأدوية في الأوعية الدموية المتضيق. تقوم هذه الأدوية بفتح الأوعية الدموية.

قد تكون هناك حاجة لتكرار حقن المخ حتى استقرار انقباض الأوعية الدموية. في بعض الأحيان ، قد يتم نفخ نوع معين من البالونات في الوعاء الدموي المتضيق للمساعدة على فتحه وبالتالي تحسين تدفق الدم. يقوم الطبيب باختيار أسلوب العلاج الأمثل بما يتناسب مع حالتك المرضية.

العلاج يقدم كخطوة إضافية لإجراء تصوير الأوعية الدموية (التصوير الوعائي). سيطلب القيام بهذا الإجراء إعطائك حقنة مخدر موضعي . وقد تكون هنا حاجة لإعطاء دواء مسكن أو تخدير كلي.

ج. مخاطر الإجراء

لقد أوصى طبيبك بعلاج انقباض الأوعية الدموية في المخ ويرى أن فوائد هذا الإجراء بالنسبة لك تفوق مخاطره . هناك مخاطر ومضاعفات مرتبطة بهذا الإجراء ، وهي تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث للدواء المستخدم ، وتشمل:

- انخفاض في ضغط الدم مما قد يتطلب العلاج بأدوية.
- ارتفاع الضغط في السوائل حول المخ مما يتطلب إعطاء أدوية وأو إدخال أنبوب تصريف مؤقت.

مخاطر ومضاعفات شائعة للإجراء الفعلي ، وتشمل:

- ألم بسيط ، كدمة و/أو عدوى عند منطقة دخول الإبرة الوريدية . قد يتطلب المعالجة بمضادات حيوية.
- ألم أو الشعور بعدم الراحة في منطقة دخول القسطرة . قد يتطلب ذلك المعالجة بالأدوية.
- حدوث نزيف أو كدمة . يتوقف ذلك عادة بوضع ضغط و/أو ثلج على موضع دخول القسطرة . يحدث ذلك بشكل أكثر شيوعاً عند من يتناولون أدوية الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن) .
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى منه ،

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

injection of anesthetic or a different method of anesthesia may be used.

- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.

Less common risks and complications of the actual procedure include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- Stroke from blood clots or damage to the artery, the blocking off of normal blood vessels in the brain. This can cause weakness in the face, arms and legs. This could be temporary or permanent.
- Failure of the injection to improve the vasospasm or it may increase the severity of the already present vasospasm.
- A blood clot or excessive bleeding from the puncture site. This may require other treatment and/or corrective surgery.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications of the actual procedure include:

- Rupture of a blood vessel during balloon inflation requiring other treatment and/or corrective surgery.
- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Skin burns or damage from exposure to x-rays.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is very rare.

If sedation is given extra risks include:

- Faintness or dizziness, especially when you start to move around
- Fall in blood pressure
- Nausea and vomiting
- Weakness
- An existing medical condition getting worse
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia, emergency treatment may be necessary

D. Risks of Iodinated Contrast Media for patients with renal impairment

Specific Risks of Iodinated Contrast Media to patient's identified as having Renal Impairment.

Giving the Contrast to people with weakened kidneys (renal impairment), can cause further kidney damage, which may in turn cause the kidneys to stop working properly (acute renal failure).

أو استخدام أسلوب تخدير آخر.

- ضرر لعصب . عادةً ما يكون ذلك مؤقتاً ، ومن المفترض تحسنه مع الوقت . من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.

مخاطر ومضاعفات أقل شيوعاً للإجراء الفعلي ، وتشمل:

- عدوى تتطلب مضادات حيوية وعلاجات أخرى.
- ضرر للأنسجة المحيطة بالأوعية الدموية ، الأعضاء الأخرى والعضلات وتتطلب معالجات أخرى.
- سكتة دماغية بسبب تخثر دموي أو ضرر يصيب الشريان مسبباً انسداد الأوعية الدموية الطبيعية في المخ . قد يسبب ذلك ضعف في الوجه ، الذراعين والساقين. قد يكون ذلك بشكل مؤقت أو دائم.
- فشل الدواء في تحسين انقباض الأوعية الدموية ، أو تسببه في تفاقم الانقباض الموجود.
- خثرة دموية أو نزيف مفرط من منطقة دخول القسطرة . قد يتطلب ذلك معالجات أخرى و/أو جراحة تصحيحية.
- رد فعل تحسسي لأي من الأدوية المعطاة . يتطلب ذلك علاجات أخرى.
- قد لا يكون القيام بالإجراء ممكناً لأسباب طبية و / أو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث للإجراء الفعلي ، وتشمل:

- تمزق في وعاء دموي أثناء نفخ البالون . قد يتطلب ذلك معالجات أخرى و/أو جراحة تصحيحية.
- زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان خلال حياة المريض بسبب التعرض للأشعة السينية.
- حروق أو ضرر يصيب الجلد بسبب التعرض للأشعة السينية.
- تشنجات و/أو سكتة قلبية بسبب سمية المادة المستخدمة في التخدير الموضعي.
- الوفاة نادرة جداً كسبب لهذا الإجراء.

مخاطر إضافية في حالة استخدام دواء التخدير المسكن ، وتشمل:

- إغماء أو دوخة ، خاصة عند البدء في الحركة بعد نهاية الإجراء.
- انخفاض في ضغط الدم .
- غثيان ، وتقيؤ .
- شعور بالضعف.
- تفاقم أي مرض آخر يعاني منه المريض.
- مشاكل في القلب والرئة كالأزمة القلبية أو دخول المادة المتبقية إلى الرئة مسببة التهاباً رئوياً. قد يتطلب ذلك تدخل علاجي طارئ.

د . مخاطر مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى

المصابين باعتلال عمل الكلى.

المخاطر المحددة لمادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

إعطاء مادة الوسط المتباين لمرضى يعانون من ضعف عمل الكلى قد يسبب أضراراً إضافية للكلى ، مما قد يسبب توقف الكلى عند العمل بشكل صحيح (فشل كلوي حاد).

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

E. Patient Consent

I acknowledge that the doctor/doctor delegate has explained the proposed procedure.

I understand:

- The risks and complications, including the risks that are specific to me.
- The sedation/anesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor/doctor delegate or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor/doctor delegate undergoing further training may conduct this procedure.

I have been given the following Patient Information Sheet:

☐ Cerebral Vasospasm Treatment

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.
- I understand that International Medical Center may release my relevant de-identified information obtained from this and related procedures for education and training of health professionals.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

F. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under:

- ☐ the Patient Consent section (E)
- ☐ Iodinated Contrast – Patients with Renal Impairment Section (D) (for renal impaired patients only).

And I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

هـ. إقرار المريض

أقر بأن الطبيب/ من ينوب عن الطبيب قد شرح لي الإجراء المقترح :
إنني على علم بما يلي :

- المخاطر والمضاعفات بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير \ الدواء المسكن المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

☐ علاج انقباض الأوعية الدموية في المخ

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيع لي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.
- أن المركز الطبي الدولي قد يستخدم المعلومات الطبية المتحصلة من حالتي المرضية وفحوصاتي الطبية لأغراض التعليم والتدريب الطبي للممارسين الصحيين ، وذلك دون الكشف عن هويتي.

وبناء على ما تقدم، فإنني أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

و. بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً ضمن:

☐ قسم إقرار المريض (هـ)

☐ مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل

الكلى (القسم "د") فقط للمرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

وأني أرى أن المريض/من ينوب عن المريض في اتخاذ القرار

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Name of
Doctor/delegate:.....
Designation:.....
Signature:.....
Date:.....Time:.....

Witnesses (for the above signature)

1) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

يدرك المعلومات المقدمة له

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:.....

طبيعة الإنابة:.....

التوقيع:.....

التاريخ:..... الوقت:.....

وقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____