

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Eyelid Surgery (Blepharoplasty)

الجراحة التجميلية لإصلاح جفن العين

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: *(Doctor to document in patient's own words)*

This condition requires the following procedure.
(Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following procedure will be performed:
Blepharoplasty is a procedure that removes fat deposits, excess skin, or muscle usually from both the upper and lower eyelids. This improves the appearance of the eyes.

C. Risks of eyelid surgery (blepharoplasty)

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment
- Bleeding could occur and may require a return to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need

1- المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم حاضراً ؟ ☐ نعم ☐ لا

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
الجراحة التجميلية لإصلاح جفن العين هي إجراء يتم فيه إزالة تراكمات الدهن ، الجلد الزائد أو عضلة عادةً من كلا الجفنين العلوي والسفلي. يؤدي ذلك إلى تحسين مظهر العينين و \ أو تحسين مجال الرؤية عند المريض.

ج. الجراحة التجميلية لإصلاح جفن العين

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه.
- حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار داياباير دامول (بيرسانتن أو اساسانتين).
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر ، وقد يتطلب علاج ذلك

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

antibiotics and physiotherapy.

- Increased risk in obese people of wound infection, infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The scar may be pink and slightly thickened. in the first few weeks after surgery, and more so in the lower eyelid. This may require make-up camouflage until it settles.
- Bruising around the eyelids which may spread to the white part of the eye where it may remain for a week to 10 days.
- The upper eyelid may slightly open when asleep. This may persist for some weeks. As a result the tissue at the front of the eye can dry out and cause scarring, which will reduce the quality of eyesight. Long term problems with tear formation or dry eye may also result. This requires the use of artificial tears.
- Ectropion, where the lower eyelid appears pulled down too far. The skin below the lower eyelid may not be as smooth as desired.
- Weakness of the lower lid, for up to two weeks. This usually settles without treatment, but may require further surgery.
- Formation of small lumps in the lower eyelid. These generally disappear over a few months. During this time, there may be temporary corneal irritation and abrasions.
- Excessive tear formation and sensitivity to bright light for the first few days.
- Blurring of vision, due to swelling and use of

استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.

- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم بسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- قد يكون الندب الجراحي وردي اللون وسميكاً بعض الشيء خلال الأسابيع الأولى التي تعقب الجراحة وخاصة في الجفن السفلي. قد يتطلب ذلك استخدام مستحضرات تجميل لتمويه وإخفائه حتى يحدث التشافى.
- حدوث كدمة حول الجفن وقد تنتشر لتصل إلى بياض العين حيث يستغرق بقاء ذلك من 7-10 أيام.
- قد يكون الجفن العلوي مفتوحاً بعض الشيء أثناء النوم. قد يستمر ذلك لعدة أسابيع ، وبسبب ذلك فقد يجف النسيج الموجود في مقدمة العين وقد يحدث فيه تندب. يؤثر ذلك سلباً في جودة البصر . قد تحدث أيضاً على المدى الطويل مشكلة في تكوين الدمع وجفاف العين. يتطلب ذلك استخدام الدموع الصناعية.
- تدلي الجفن السفلي للأسفل بعيداً عن العين. قد لا يكون الجلد الموجود أسفل الجفن السفلي بدرجة النعومة المرغوبة.
- ضعف في الجفن السفلي لفترة تستمر حوالي الأسبوعين. غالباً ما يتعافى ذلك دون الحاجة لعلاج ، ولكنه قد يتطلب جراحة أخرى.
- نشوء كتل صغيرة في الجفن السفلي . عادةً ما تختفي خلال عدة أشهر. خلال هذه الفترة قد يحدث تهيج مؤقت أو خدوش مؤقتة في القرنية.
- فرط إنتاج الدمع وحساسية للأضواء المتوهجة خلال الأيام الأولى التي تعقب الإجراء.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

ointment in the eye.

- Double vision, which may last for a day or two after the operation. This usually recovers spontaneously and is a result of the bruising.
- Wound infection, bruising and fluid collecting under the skin. This may require drainage of any tissue fluid that is infected or accumulated under the skin. This may delay the speed of wound healing and may cause disfigurement.
- Blindness. This is an extremely remote and rare possibility.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed).

• ضبابية في النظر بسبب التورم واستخدام مرهم العين.

• الرؤية المزدوجة. قد تستمر ليوم أو يومين بعد الجراحة. غالباً ما يتعافى ذلك بشكل تلقائي وهو نتيجة للكدمة.

• عدوى الجرح ، كدمة و تجمع للسوائل تحت الجلد . قد يتطلب ذلك سحب وتصريف لأي سائل داخل الأنسجة بها عدوى أو متجمعة تحت الجلد. قد يؤثر ذلك في سرعة التئام الجرح وقد يسبب تشوه.

• الإصابة بالعمى من المضاعفات المحتملة النادرة والمستبعد جداً حدوثها.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

ز. إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

☐ **Local Anaesthetic & Sedation for Your Procedure**

☐ **Eyelid Surgery (Blepharoplasty)**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed investigation and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my investigation and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:.....Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date:.....Time:.....

Contact No:

☐ **التخدير الموضعي والدواء المسكن المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لي**

☐ **الجراحة التجميلية لإصلاح جفن العين**

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتي والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيع لي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

القرار :

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ : الوقت:

رقم الإتصال :

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____