

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

**Eylea (Aflibercept)
Intravitreal Injection**

حقن آيليا (أفليبرسيبت) داخل الزجاجي

A. Interpreter / cultural needs

An Interpreter Service is required?

☐ Yes ☐ No

If Yes, is an Interpreter present?

☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

☐ Right Eye ☐ Left Eye

C. Risks of Eylea Injection

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

POSSIBLE BENEFITS:

Eylea (Aflibercept) was approved for Age-related Macular Degeneration and refractory macular edema in Retinal Vein Occlusion and Diabetic Macular Edema based upon research that shows that Vascular Endothelial Growth Factor is one of the causes for the growth of the abnormal vessels and edema that cause these conditions. Some patients treated with TM Eylea (Aflibercept) had less fluid and more normal-appearing macula, and their vision improved.

Eylea (Aflibercept) is also used, therefore, to treat macular edema, or swelling of the macula in Retinal Vein Occlusion, Diabetic Macular Edema and another cases

specified by retina specialist.

POSSIBLE LIMITATIONS AND ADMINISTRATION:

The goal of treatment is to prevent further loss of vision. Although many patients have regained vision, the medication may not restore vision that has already been lost, and may not ultimately prevent further loss of vision caused by the disease. Eylea (Aflibercept) is administered by an injection into your eye as needed at regular intervals (about every four weeks); your ophthalmologist will tell you how often you will receive the injection, and for how long.

D. Complications of Eylea

Your condition may not get better or may become worse. Any or all of these complications may cause decreased vision and/or have a possibility of causing blindness. Additional procedures may be needed to treat these complications.

أ- المترجم/ الاحتياجات التثقيفية

حدد الاحتياج لخدمة الترجمة؟

☐ نعم ☐ لا

في حال نعم هل المترجم حاضر؟

☐ نعم ☐ لا

ب - الحالة و العلاج

لقد شرح الطبيب لك أنك مصاب بالمرض التالي (سجل نفس كلمات المريض)

هذه الحالة تحتاج للإجراء التالي (يسجل الموضع والجانب)

☐ عين يميني ☐ عين يسرى

ج- مخاطر حقن الأيليا

هناك بعض المخاطر والمضاعفات مع هذا الإجراء وتتضمن ولكن غير محددة بالاتي:

الفوائد المحتملة:

تم اعتماد حقن الأيليا (أفليبرسيبت) في تنكس الشبكية المرتبط بالعمر (الشيخوخة) وارتشاح اللطخة المعد في سياق انسداد الوريد الشبكي وفروعه وفي اعتلال الشبكية السكري (ارتشاح اللطخة السكري) وذلك بناء على دراسات تقول أن العامل البطاني المنمي للأوعية هو أحد مسببات ارتشاح وتنمي الأوعية الشاذة. في هذه الحالات عند استخدام الأيليا أصبح الارتشاح أقل لدى المرضى وكذلك أصبحت اللطخة تبدو أقرب للوضع الطبيعي كما حدث تحسن في حدة الإبصار لديهم ومن أجل ذلك تم استخدامه في ارتشاح اللطخة الناجم عن الداء السكري، انسداد الوريد الشبكي

وحالات أخرى يحددها اختصاصي الشبكية.

الحدود المحتملة وطريقة الإعطاء:

هدف الحقن هو منع تدهور النظر عند المريض وبالرغم من تحسن حدة الإبصار عند الكثيرين لكن قد لا تستعيد النظر الذي فقدته وقد لا يحقق الحقن تثبيت النظر لديك. يتم إعطاء الأيليا (أفليبرسيبت) بالحقن داخل العين بحسب الحاجة بفواصل منتظمة (كل أربعة أسابيع تقريبا) وسيحدد لك ذلك طبيب العيون كما سيحدد مدة العلاج الإجمالية

د- اختلاطات حقن الأيليا

قد لا تتحسن حالتك وقد تصبح أكثر سوءا. أي من الاختلاطات التالي سردها قد تقلل حدة الإبصار و/أو تسبب احتمال العمى. قد تحتاج إجراءات إضافية ضرورية لعلاج المضاعفات.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

During the follow-up visits or phone calls, you will be checked for possible side effects and the results will be discussed with you.

Possible complications and side effects of the procedure and administration of Eylea (Aflibercept) include but are not limited to:

Risks/Complications:

1. Retinal detachment
2. Cataract formation
3. Glaucoma
4. Hypotony
5. Damage to the retina or cornea
6. Bleeding
7. Endophthalmitis
8. Nonfatal stroke
9. Nonfatal heart attack
10. Arterial death

*multiple international studies

You may receive eye drops with instructions on when to use them to reduce the possibility of this occurring. Any of these rare complications may lead to severe, permanent loss of vision.

There is a potential risk of arterial thromboembolic events (ATEs), defined as, nonfatal heart attack, and, following intravitreal use of anti-VEGF drugs. The rate of ATEs was low during the clinical trials. Whenever a medication is used in a large number of patients, a small number of coincidental life-threatening problems may occur that have no relationship to the treatment. Patients with diabetes

are already at increased risk for heart attacks and strokes, and the clinical trial conducted in order to approve this drug for diabetic macular edema showed that diabetic patients had slightly more deaths. There were not many deaths, and the cause was typical of patients with advanced diabetic complications. It is not clear, therefore, whether the drug or the diabetes caused the deaths.

E. Known Risks of Intravitreal Eye Injections

Patients receiving an injection of Eylea (Aflibercept) may experience less severe side effects related to the pre-injection preparation procedure (eyelid speculum, anesthetic drops, dilating drops, antibiotic drops, povidone-iodine drops and the injection of the anesthetic). These side effects may include eye pain, subconjunctival hemorrhage (bloodshot eye), vitreous floaters, irregularity or swelling of the cornea, inflammation of the eye, and visual disturbances.

خلال زيارات المتابعة أو الاتصال الهاتفي معك سيتم توقع التأثيرات الجانبية المحتملة ونتائجها وسيتم مناقشتها معك

المضاعفات والآثار الجانبية لحقن الأيليا (أفليبرسيبت) داخل الزجاجي ممكن أن تشمل ولكن لا تقتصر على:

الاختلاط

- تكون مياه ببيضاء
- هبوط ضغط العين
- نزف
- انفصال شبكية
- أذية القرنية أو الشبكية
- التهاب باطن العين
- جلطة دماغية غير مميتة
- أزمة قلبية غير مميتة
- موت شرياني

* دراسات عالمية متعددة

قد تحتاج لعلاجات أو جراحة إضافية لتدبير أية اختلاط محتمل ستحصل على قطرات مع إرشادات حول استخدامها لتقليل الاختلاطات التي من الممكن أن تسبب تدني شديد في الرؤية أو حتى فقدانها بشكل دائم هناك خطر حدوث صدمات خثرية شريانية تعرف باسم الأزمة القلبية غير المميتة بسبب هذا الحقن لكن نسبتها قليلة بحسب الأبحاث الطبية وقد تكون عبارة عن حوادث مرافقة لإعطاء الأدوية خاصة عندما يكون عدد المرضى كبيراً خلال إجراء الأبحاث وقد تكون هذه لا علاقة لها بشكل مباشر مع الدواء المعطى كما أن مرضى السكري تكون

لديهم خطورة الأزمات القلبية والدماغية أعلى من حيث المبدأ وبالتالي يكون نقل تقارير عن هذه الحوادث من قبيل إثبات أن هذه الحالات قد تكون أعلى بشكل طفيف. لم تكن هناك حالات وفيات كثيرة وهذه الحالات عندما وجدت كانت في مرضى متقدمين في اختلاطات الداء السكري وبالتالي ليس من الواضح أن حدوثها ناجم عن الحقن أم عن اختلاطات المرض نفسه

هـ - المخاطر المتعارفة للحقن داخل الزجاجي في العين

قد يحصل لدى المرضى الخاضعين لحقن الأيليا آثار جانبية أقل شدة من تلك التي قد تحدث أثناء التحضير

للحقن نفسه (استخدام ميعد الأجفان قطرات التخدير وحقن التخدير والمعدات الجراحية) هذه الآثار الجانبية تشمل على النزف تحت الملتحمة ، الألم ، رؤية ذباب طائر، ارتشاح القرنية ، التهاب العين ، اضطرابات في الرؤية

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

F. Patient Responsibilities

I will immediately contact my ophthalmologist if any of the following signs of infection or other complications develop: pain, blurry or decreased vision, sensitivity to light, redness of the eye (compared to immediately after the injection), or discharge from the eye. I have been instructed NOT to rub my eyes or swim for three days after each injection. I will keep all post-injection appointments or scheduled telephone calls so my doctor can check for complications.

G. Patient Consent

The above explanation has been read by/to me. The nature of my eye condition has been explained to me and the proposed treatment has been described. The risks, benefits, alternatives, and limitations of the treatment have been discussed with me. All my questions have been answered.

I hereby authorize Dr. _____ to do to administer the intravitreal injection of Eylea (Aflibercept) in my _____ (state "right eye" or "left eye" or "both eyes") at regular intervals as needed. This consent will be valid until I revoke it or my condition changes to the point that the risks and benefits of this procedure for me are significantly different.

I understood the benefits and limitation, possible complication of the procedure and have been explained to me thoroughly. I have read this consent. I understood the benefits, understood my condition, the benefits of the procedures, the limitations and possible complications and I request and agree on performing the surgery by

Dr. _____

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker.

I, the undersigned, take full responsibility and act on behalf of this patient. I consider myself authorized to sign on his behalf and will bear any conflict that arises from this authorization.

Decision Maker

Signature:

Date: Time:

H. Doctor/Delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent Section and I am of the opinion that the patient /substitute decision-maker has understood the information.

و- واجبات المريض

سأصل بالطبيب فوراً في حال حدوث أي من الأعراض التالية التي قد توجي بتطور التهاب أو اختلاطات أخرى: ألم في العين، تشوش أو ضعف في حدة الإبصار، احمرار زائد في لون العين (مقارنة مع الوضع التالي للحقن مباشرة) ، خروج إفرازات من العين لقد أخبرت بعدم القيام بدعك العين أو السباحة لمدة ثلاثة أيام بعد كل حقن سأحافظ على المتابعة بعد الحقن بالمواعيد المقررة أو بالهاتف حيث سيسفسر الطبيب عن احتمال حدوث الاختلاطات

ز- موافقة المريض

تمت قراءة التفسير المذكور أعلاه من قبل / لي. وقد شرحت لي طبيعة حالتي ووصف العلاج المقترح. وقد تمت مناقشة المخاطر والمنافع، والبدائل، والقيود المفروضة على المعالجة معي. تم الرد على جميع أسئلتي.

أنا أفوض الدكتور _____ لإجراء حقن داخل الزجاجي لمادة الألبيا (أفليبرسيبت) في _____ (تحديد "العين اليمنى" أو "العين اليسرى" أو "كلتا العينين") على فترات منتظمة حسب الحاجة. وهذه الموافقة سارية المفعول حتى ألغياها أو أن حالتي قد تغيرت لدرجة أن مخاطر وفوائد هذا الدواء بالنسبة لي تختلف اختلافاً كبيراً.

فهمت الفوائد والحدود، المضاعفات المحتملة لهذا الإجراء، وقد شرح لي بدقة. لقد قرأت هذه الموافقة. فهمت الفوائد، وفهمت حالتي، وفوائد الإجراء والقيود والمضاعفات المحتملة وقد تم الاتفاق على الإجراء من قبل

الدكتور _____

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

للمرضى غير القادرين على إعطاء الموافقة

يجب الحصول على الموافقة بواسطة صانع القرار بديل عن المريض

أنا الموقع أدناه أتحمل كامل المسؤولية وأتصرف كبديل عن هذا المريض أعتبر نفسي مخول للتوقيع بدلا عنه وأتحمل نتيجة أي تعارض ينجم عن هذا التفويض

صانع القرار:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

ح - إقرار الطبيب/ المفوض عنه

لقد شرحت للمريض كل ما ذكر أعلاه من نقاط ضمن فقرة موافقة المريض ويرأي أن المريض ومن ينوب عنه في القرار قد فهم المعلومات المذكورة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Name of Doctor/delegate:.....

Designation:.....

Signature:

Date:Time:.....

Witnesses (for the above signature)

1) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

.....: الطبيب/ المفوض

.....: المندوب

.....: التوقيع

.....: التاريخ

.....: توقيع الشهود

.....: الاسم (1): التاريخ

.....: التوقيع: الوقت

.....: الاسم (2): التاريخ

.....: التوقيع: الوقت