

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Allergy skin test consent form

The most often used method for skin testing is the skin prick test. The test exposes you to tiny amounts of items which you may be allergic. If you are allergic to a substance a reaction will appear. The doctor and or the nurse will examine any pump that appear and the reddened area around it to decide whether a positive reaction has occurred indicating an allergy in the prick test , the allergens are applied to tiny scratches that penetrate only the very top layer of the skin and rarely draw blood . You may feel only slight prick or scraping of the skin; if just a few tests are given the arm may be used. Reactions are usually seen in ten to fifty minutes if they are going to occur.

Reactions to testing can include itchy welts that last for several days and rarely (less than 1%) hives, swelling, sneezing, shortness of breath and light headiness

The risk and benefits of the allergy prick testing have been explained by my doctor and his staff. I am satisfied with the explanation that has been given and do not desire further information.

i give permission and consent for this procedure.

****IN ORDER TO AVOID COMPLICATIONSN AND /OR INTERACTIONS PLEASE INFORM THE NURSE IF U HAVE HAD A MEDICATION CHANGE OR AN ADDITION TO YOUR REGIMEN SINCE THE PREVIOUS CLINIC VISIT****

PATIENT NAME

DATE and TIME

SIGNATURE (PATIENT OR GUARDIAN)

WITNESS

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

الموافقة على اجراء اختبار التحسس الجلدي

ان اكثر طريقة مستخدمة لاجراء اختبار التحسس الجلدي هي اجراءه عن طريق الوخز و هذا الفحص يعرضك لكميات قليلة من مواد معينة قد تكون متحسس عليها. وعند وجود اي عوارض فأن ردة فعل تحسسية على الجلد سوف تظهر, سوف يقوم الطبيب او الممرضة المختصة بفحص ردة الفعل الناتجة على شكل احمرار مع اندفاع في الجلد ليقرر ما اذا كانت ردة فعل ايجابية ام لا, و يتم تطبيق الفحص بحقن المواد بوخزات صغيرة نادرا ما تسبب خروج اي نقط دموية و تصيب الطبقة السطحية من الجلد مما يسبب الشعور بوخزات قليلة و عادة ما يجرى في منطقة الساعد و تظهر النتائج على الجلد خلال 10-15 دقيقة و يمكن ان تبقى اثار الحكة لبضعة ايام و في حالات قليلة جداً (اقل من 1%) سوف يكون هناك تورم (في مكان الحقن), عطاس, ضيق في التنفس مع صداع, حكة وخفة في الراس.

ان مخاطر و منافع اختبار التحسس قد تم شرحها من قبل طبيبي المعالج او الفاحص و طاقمه الطبي المرافق و انا راض عن المعلومات التي قدمت لي ولا ارغب بالمزيد و اعطي موافقتي لاجراء هذا الفحص.

لتجنب حدوث عوارض مرضية او اختلاطات يرجى اخبار الممرضة عن اي تغيرات في الادوية او العلاجات التي تتناولها

التاريخ:

اسم المريض:

التوقيع (المريض او ولي الامر)

الشاهد: