

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Appendicectomy – Open

معلومات الإقرار – نسخة المريض استئصال الزائدة الدودية عن طريق الفتحة

1. What is an open appendicectomy?

An open appendicectomy is the removal of the appendix through a cut on the lower right side of the abdomen.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.

1. ما هو استئصال الزائدة الدودية عن طريق الفتحة؟

هو استئصال الزائدة الدودية من خلال شق جراحي في الجزء السفلي الأيمن من البطن.

2. التخدير الذي أتلقيه

يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ تعليمات التخدير الموضعي والأدوية المسكنة المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير

مقتصرة على :

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يحدث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دابايير دامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Deep bleeding in the abdominal cavity. This may need fluid replacement or further surgery.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- A weakness can occur in the wound with the development of a rupture. This may need further surgery.
- The wound may become thickened and red.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long term complication and may need further surgery.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

Notes to talk to my doctor about:

- يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من الجلطة ليصل إلى الرئة.
- قد تحدث الوفاة كنتيجة للقيام بهذا الإجراء.

مخاطر متعلقة بهذا الإجراء تحديداً:

- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- الإصابة بعدوى كتجمعات للصدید في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصدید جراحياً.
- ضعف قد يعترى الشق الجراحي ويؤدي إلى تمزقه مما قد يستدعي جراحة أخرى.
- قد تزداد سماكة الجرح ويصبح لونه أحمر .
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.
- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي :
