

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Circumcision (Adult)

معلومات الإقرار – نسخة المريض الختان (البالغين)

1. What do I need to know about this note to talk to my doctor about procedure?

A circumcision (Adult) procedure is the removal of the foreskin at the end of the penis. The remaining skin is stitched in place just below the head of the penis.

2. My Anaesthetic.

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.

1. ما الذي علي معرفته عن هذا الإجراء؟

ملاحظات أتحدث عنها مع طبيبي.

الختان عند البالغين هو إزالة (القفلة أو الغرلة) وهي الجزء الأمامي من نهاية العضو الذكري. يتم خياطة الجزء المتبقي من الجلد في موضع مباشرة أسفل رأس العضو.

2. التخدير الذي أتلقيه

قد يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير.

اقرأ تعليمات التخدير الموضعي والأدوية المسكنة المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك.

للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى (التهاب)، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- حدوث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابايردامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر، مضاعفات في القلب والرئة، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The penis may not look cosmetically pleasing. The tip of the penis may be injured.
- The end of the penis may be raw and bleed after the operation.
- More skin may need to be removed.
- Scar tissue may cause blockage to urine flow from the end of the penis.

Notes to talk to my doctor about:

- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة متعلقة بهذا الإجراء:

- من الناحية التجميلية ، قد لا يظهر العضو الذكري بشكل مرض. قد يتضرر طرف العضو.
- الجزء الأخير من العضو الذكري قد يكون مقشوط الجلد ويحدث منه نزيف بعد العملية.
- الحاجة لإزالة المزيد من الجلد.
- قد يتكون نسيج نادب وقد يمنع خروج البول من نهاية العضو.

أمر أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
