

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Diagnostic Hysteroscopy Dilation & Curettage

منظار الرحم التشخيصي توسعة عنق الرحم والكحت

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is a qualified Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:

Under an anaesthetic, the cervix is carefully widened until there is enough room to pass a telescope into the womb. The womb is then filled with fluid, which gives a better view of the inside. A telescope is used to see if there is anything abnormal inside the womb. The fluid is then drained out.

The lining of the womb is usually scraped to collect cells. The lining of the uterus and any other tissue that looks abnormal inside the uterus is then removed and may be sent to pathology for tests.

C. Risks of a diagnostic hysteroscopy dilatation & curettage

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Bleeding that can be so heavy that a blood transfusion may be needed. It may also need further surgery.

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي
هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟

نعم ☐ لا ☐
تعم ☐ لا ☐

ب. الحالة المرضية والعلاج
لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
تحت التخدير ، تتم توسعة عنق الرحم بحذر حتى تصبح فتحة عنق الرحم ملائمة لإدخال المنظار إلى داخل الرحم. يتم بعد ذلك ملئ الرحم بسوائل تساعد على إعطاء رؤية أكثر وضوحاً لداخل الرحم. يستخدم المنظار لرؤية إي شذوذ عن الطبيعى داخل الرحم . يتم بعد ذلك سحب وتصريف السوائل.
يتم عادةً كشط الطبقة المبطنة للرحم لجمع الخلايا . يتم بعد ذلك إزالة بطانة الرحم وأي نسيج آخر غير طبيعى موجود في الرحم . قد يتم إرسال ما تم جمعه إلى مختبر علم الأمراض لفحصه.

ج. مخاطر منظار الرحم التشخيصي توسعة عنق الرحم والكحت

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتين أو اساسانتين)
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعى (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- قد يحدث نزيف شديد جداً لدرجة قد تصل إلى الاضطراب لنقل الدم. قد تكون هناك أيضاً حاجة لجراحة أخرى.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Damage may occur to the uterus with rupture or perforation. This may require a laparoscopy and/or laparotomy, and/or longer stay in hospital than expected. In the event of uterine perforation, there is a risk of damage to other organs, such as bowel or bladder, which may require further corrective surgery.
- Rarely, the procedure may not be able to be completed, due to narrowing of the inside of the cervix. If the condition continues, further surgery will be necessary.
- Infection in the uterus. This can cause heavy bleeding or discharge, worsening cramps or high fevers. The infection may affect the tubes and cause problems with getting pregnant in the future. Antibiotics are used to treat the infection.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained:

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their

- قد يحدث ضرر للرحم كالتمزق أو الانتقاب . قد يستدعي ذلك عمل منظار للبطن أو فتح البطن ، وقد يؤدي ذلك إلى البقاء في المستشفى لفترة زمنية أطول مما كان متوقعاً . عند حدوث انتقاب للرحم ، فقد يكون هناك خطر بتضرر أعضاء أخرى كالأمعاء أو المثانة البولية ، وقد يتطلب ذلك جراحة تصحيحية أخرى.
- من النادر عدم تمكن الطبيب من مواصلة الإجراء بسبب ضيق داخل عنق الرحم. إذا استمر المرض قد تكون هناك حاجة لجراحة.
- عدوى في الرحم. قد يسبب ذلك نزيف أو إفرازات شديدة ، مغص متفاقم أو ارتفاع في درجة الحرارة. قد تؤثر العدوى على أنابيب الرحم وتسبب مشاكل في القدرة على الحمل في المستقبل . تستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير . (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

associated risks.

- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

☐ **About Your Anaesthetic**

☐ **Diagnostic Hysteroscopy Dilation & Curettage**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

.....

Signature:.....

Relationship to patient:

Date:.....

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-

- الخيارات الإجرائية الطبية \العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسين حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ،وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

- نوعية التخدير المقدم لي
- منظار الرحم التشخيصي توسعة عنق الرحم والكحت
- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني

أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ:

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك القدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.
اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار

.....

التوقيع:

صلته بالمريض:

التاريخ:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:.....

Designation:.....

Signature:.....

Date:

Witnesses (for the above signature)

1) Name:.....

Signature:

Date: Time:.....

2) Name:.....

Signature:

Date: Time:.....

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:.....

طبيعة الإنابة:.....

التوقيع:.....

التاريخ:.....

الشهود (على التوقيع أعلاه)

1) اسم :.....

التوقيع :.....

التاريخ :..... الوقت:.....

2) اسم :.....

التوقيع :.....

التاريخ :..... الوقت:.....