

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Breast - Fibroadenoma / Cyst

معلومات الإقرار – نسخة المريض الورم الغدي الليفي في الثدي/ كيس الثدي

1. What is a breast fibroadenoma cyst?

Simple fibroadenomas are benign solid tumors containing glandular and fibrous tissue. Simple cysts are fluid filled round or oval lumps. This procedure will involve the removal of a breast lump which is sent to pathology for testing.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.
If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung

1. ماهو الورم الغدي الليفي في الثدي/ كيس الثدي؟

الأورام الغدية الليفية البسيطة في الثدي هي أورام حميدة صلبة تحتوي على أنسجة من الغدد وأنسجة من الألياف. أكياس الصدر البسيطة هي كتل مستديرة أو بيضاوية ممتلئة بسوائل. يتكون الإجراء من إزالة لكتلة الثدي وإرسالها لمختبر علم الأمراض للكشف عليها واختبارها.

2. التخدير الذي أتلقيه

يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير. اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء ؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى، مما يتطلب العلاج بالضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يعقب أخذ العينة حدوث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايابير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين)
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر، مضاعفات

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

complications, and thrombosis.

- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may breakoff and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Bruising may occur around the operation site.
- There may be a depression in the breast at the site of the excised lump.
- Scarring may pull the nipple out of shape.
- The scar may be thickened and red coloured, and it may be painful.
- The pathologist may be asked to test the lump for malignancy. Sometimes the initial test - the frozen section done at the time of the operation - may miss malignancy. The Pathologist always does a second section to double check. This takes a few days to come back. Further surgery may be necessary.

Notes to talk to my doctor about

في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.

- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- قد تحدث الوفاة كنتيجة للقيام بهذا الإجراء.

مخاطر خاصة بهذا الإجراء:

- حدوث كدمات حول موضع العملية
- حدوث انخفاض في مستوى الثدي في الموضع الذي أخذت منه العينة (الجزء المقطوع)
- التندب الناتج عن الجراحة قد يغير مظهر حلمة الصدر
- الندبة الناتجة عن إجراء الجراحة قد تزداد سماكتها و يصبح لونها أحمر وقد تكون مؤلمة
- قد يطلب من اختصاصي علم الأمراض فحص الكتلة المزالة واختبار احتوائها على خلايا خبيثة. في بعض الأحيان ، قد لا يكتشف الاختبار المبدئي للكتلة المزالة والمعتمد على تجميده الكتلة ويجرى بالتزامن مع إجراء العملية ، قد لا يكتشف وجود الخلايا السرطانية الخبيثة. يقوم اختصاصي علم الأمراض بشكل دائم بإجراء اختبار ثان على الكتلة للتأكد من النتيجة ، وقد يستغرق ظهور النتيجة عدداً من الأيام. قد يكون من الضروري القيام بجراحات أخرى لاحقة.

أمور أناقشها مع طبيبي المعالج
