

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Fistula – Faecal/Small Bowel/Gastric

معلومات الإقرار – نسخة المريض الناصور – البرازي/الأمعاء الدقيقة/المعدي

1. What is a fistula (faecal / small bowel / gastric)?

A fistula is an abnormal track between two organs in the body or between an organ and the exterior of the body.

The surgical closure of the fistula (track) that has formed between the bowel and the skin is needed.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet**
OR Anaesthetic: Nerve Block information sheet

OR Epidural and Spinal Anaesthetic information sheet for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Asprin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.

1. ما هو الناسور – البرازي/الأمعاء الدقيقة/المعدي ؟
الناصور هو ممر غير طبيعي بين اثنين من الأعضاء في الجسم ،
أو بين أحد أعضاء الجسم وخارج الجسم.
هناك حاجة للإغلاق الجراحي للناصور المتكوّن بين الأمعاء
والجلد.

2. التخدير الذي أتلقيه
يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير.
اقرأ تعليمات التخدير الخاصة بك
أو معلومات التخدير لعصب معين
أو معلومات التخدير النصفي: التخدير النخاعي (الشوكي) &
تخدير فوق الجافية ، لتحصل على المزيد من المعلومات عن نوع
التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات
قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟
لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة
على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية
وعلاجات أخرى
- حدوث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة
العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن
يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل
الوارفرين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو
عقار دايبيرومادول (بيرسانتن أو اساسانتن)
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد
من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج
ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي)
للصدر.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Especially in a male there may be difficulty passing urine and a tube may need to be inserted into the bladder, until the bladder can empty normally.
- Deep bleeding in the abdominal cavity. This may need fluid replacement or further surgery.
- Part of the bowel may need removal. The joined part of the bowel may cause problems such as leaking of bowel fluid and infection in the abdomen. This may need further surgery.
- Damage may occur to other parts of the bowel in the attempt to fix the fistula. This may need further surgery.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after surgery and this may cause building up of fluid in the bowel with bloating of the abdomen and vomiting. Further treatment may be necessary for this.
- A weakness can occur in the wound with complete or incomplete, bursting of the wound in the short term, or a hernia in the long term. This may need further surgery.
- The wound can be thickened and red and maybe painful.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short

- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر خاصة بهذا الإجراء:

- عند الذكور بشكل خاص ، قد تكون هناك صعوبة في إدرار البول مما قد يتطلب وضع أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة حتى تعاود المثانة إدرار البول بشكل طبيعي.
- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- قد تكون هناك حاجة لإزالة جزء من الأمعاء. الجزء المتصل من الأمعاء قد يسبب مشاكل مثل تسريب سوائل الأمعاء و عدوى في البطن. قد يحتاج ذلك لجراحة أخرى.
- عند تثبيت الناسور ، قد يحدث ضرر لجزء من الأمعاء. قد يتطلب ذلك عملية أخرى.
- الإصابة بعدوى كتجمعات للصدى في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصديد جراحياً.
- قد يحدث شلل لحركة الأمعاء بعد الجراحة أو قد يحدث انسداد للأمعاء ويؤدي كل ذلك لتراكم السوائل في الأمعاء وانتفاخ للبطن واستفراغ. قد يتطلب ذلك المزيد من العلاج.
- ضعف قد يعترى الشق الجراحي ويؤدي إلى انفجار كامل أو جزئي للجرح على المدى القصير ، أو تمزق على المدى البعيد. قد يستدعي ذلك جراحة أخرى.
- قد تزداد سماكة الجرح ويصبح مؤلماً ولونه أحمر.
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

term or a long term complication and may need further surgery.

- The fistula may recur.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

Notes to talk to my doctor about:

انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً

- قد يعود الناسور للظهور.
- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.

أُمُور أناقشها مع الطبيب:
