

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Parent/Patient Copy Intussusception Repair Child/Young Person

معلومات الإقرار – نسخة والد المريض/ المريض
إصلاح الانغداد (التدخل) المعوي الأطفال/ صغار السن

1. What do I need to know about this procedure?

Surgical repair of the area of the bowel, which has slipped inside another piece of bowel.

2. My Anaesthetic.

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Child's Anaesthetic** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor. If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur which may require treatment including antibiotics.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin or Aspirin.
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Impaired circulation may occur to a limb or to an organ which may require further treatment.
- Death or brain damage as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Deep bleeding inside the abdomen. This may need fluid replacement or further surgery.
- Damage of the bowel, which may cause leakage

1. ما الذي ينبغي أن أعرفه عن هذا الإجراء؟

هو إجراء جراحي يتم فيه إصلاح جزء من الأمعاء حدث له انزلاق داخل جزء آخر من الأمعاء.

2. التخدير الذي أتلقاه

قد يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير. اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لطفلك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات، نرجو عدم التردد في

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يحدث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين.
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- اختلال في الدورة الدموية لأحد الأطراف أو الأعضاء. قد يتطلب ذلك علاج لاحق.
- الوفاة و تضرر المخ كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة لهذا الإجراء:

- نزيف عميق داخل البطن قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

of bowel fluid. This may need further surgery.

- The bowel movement may be slow to return to normal after surgery. This may cause a build up of fluid in the bowel with bloating of the tummy and vomiting. Further treatment may be necessary for this.
- Infections such as pus inside the abdomen. This may need surgical drainage.
- Part of the bowel may need to be removed due to irreversible damage.
- In some children, healing of the wound may be abnormal. The wound can be thickened and red and the wound may be painful.
- A hernia caused by a weakness in the wound. This may need further surgery.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause blockage of the bowel. This can be a short term or a long term complication and may need further surgery.
- The intussusception may come back.

Notes to talk to my doctor about:

- قد يحدث ضرر للأمعاء ويؤدي إلى تسرب لسوائل الأمعاء . قد يحتاج جراحة أخرى.
- قد تكون عودة الأمعاء لحركتها الطبيعية بطيئة بعد الجراحة ، ويؤدي ذلك لتراكم السوائل في الأمعاء وانتفاخ للبطن واستفراغ. قد يتطلب ذلك المزيد من العلاج.
- الإصابة بعدوى كتجمعات للصدید في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصدید جراحياً.
- وجود ضرر غير قابل للإصلاح قد يجعل من الضروري إزالة جزء من الأمعاء .
- لدى بعض الأطفال ، قد يحدث التئام غير طبيعي للجرح ، وقد تزداد سماكة الجرح ويصبح لونه أحمر ويكون مؤلماً.
- قد يحدث فتق بسبب ضعف في الجرح . قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.
- قد يحدث الانغداد المعوي مرة أخرى.

أمور أناقش فيها طبيبي:
