

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Ischiorectal / Perianal Abscess

معلومات الإقرار – نسخة المريض الخراج الإسكي المستقيمي/الخراج حول الشرج

1. What is an ischiorectal / perianal abscess?

A perianal abscess is an infection involving soft tissues in the region of the anal canal. An ischiorectal abscess is a more specific term used to describe a perianal abscess that results in the formation of pus between the rectum and the pelvic bone (ischio-rectal space).

Both conditions require surgical drainage of the abscessed area.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **Anaesthetic: Nerve Block information sheet**

OR Epidural and Spinal Anaesthetic

information sheet for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung

1. ماهو الخراج الإسكي المستقيمي/الخراج حول الشرج ؟

الخراج حول الشرج هو عدوى في الأنسجة الرطبة في منطقة القناة الشرجية. الخراج الإسكي المستقيمي هو مصطلح أكثر تحديداً يستخدم لوصف خراج حول الشرج الذي ينتج عنه صديد (قيح) في المنطقة الواقعة ما بين المستقيم وعظمة الحوض (الفراغ الإسكي المستقيمي). كلا الحالتين تتطلبان إفراغ جراحي للمنطقة التي فيها الخراج.

2. التخدير الذي أتلقيه

يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير .

اقرأ تعليمات التخدير الخاصة بك

أو معلومات التخدير لعصب معين

أو معلومات التخدير النصفي: التخدير النخاعي (الشوكي) &

تخدير فوق الجافية ، لتحصل على المزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.

إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- حدوث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسيرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن)
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ،



Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

complications, and thrombosis.

- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Heavy bleeding may occur from the wound. This may require further surgery and rarely a blood transfusion.
- The abscess may recur or a fistula may develop. This may require further surgery.
- Further drainage may be necessary to open up other foci of infection.
- The wound may be thick or reddened as healing occurs, and may be painful.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

Notes to talk to my doctor about:

وجلطات الأوعية الدموية

- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم
- يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل
- جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر خاصة بهذا الإجراء:

- نزيف حاد قد يحدث من الجرح . قد يتطلب ذلك جراحة أخرى ، ومن النادر أن يتطلب نقل دم.
- قد يعود الخراج للظهور مرة أخرى أو قد يتكوّن ناسور. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- قد تتكرر عملية التصريف الإفراغ الجراحي لفتح المزيد من بؤر العدوى.
- قد تزداد سماكة الجرح أو يصبح محمراً بسبب الالتئام ، وقد يكون مؤلماً.
- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.

أمر أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
