

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____


Consent Information – Patient's Copy
Lumbar Puncture for Intrathecal Chemotherapy

معلومات الإقرار – نسخة المريض
 البزل القطني لحقن العلاج الكيماوي داخل القرباب

1. What is a lumbar puncture intrathecal chemotherapy injection?

A lumbar puncture Intrathecal Chemotherapy Injection is a procedure that uses x-ray to guide a needle into position, so chemotherapy drugs can be injected into your spinal fluid.

Sometimes, a small amount of cerebrospinal fluid (CSF) will be collected and sent to pathology for testing.



Medical Illustration Copyright © Nucleus Medical Art.
 All Rights Reserved. www.nucleusinc.com

2. Will there be any discomfort, is any anaesthetic needed?

This procedure will require an injection of local anaesthetic. The local anaesthetic is used to numb a small part of your back. It is used to prevent or relieve pain, but will not put you to sleep.

3. Preparation of the procedure.

The medical imaging department will give you instructions on how to prepare for your procedure.


Please tell the staff if you are or suspect you might be pregnant or are breastfeeding.

If you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin) or any other drug that is used to thin your blood ask your doctor/health practitioner if you should stop taking it before the procedure as it may affect your blood clotting.

List or bring all your prescribed drugs, those drugs you buy

1. ماهو البزل القطني لحقن العلاج الكيماوي داخل القرباب ؟
 البزل القطني لحقن العلاج الكيماوي داخل القرباب هو إجراء يستخدم الأشعة السينية لتوجيه حقنة إلى الموقع المناسب لحقن العلاج الكيماوي في السائل الشوكي .

أحياناً ، ترسل عينة من السائل النخاعي (سائل المخ والحبل الشوكي) إلى مختبر علم الأمراض لفحصها.



Medical Illustration Copyright © Nucleus Medical Art.
 All Rights Reserved. www.nucleusinc.com

2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟
 يتطلب الإجراء حقنة مخدر موضعي لتخدير جزء صغير من ظهرك. غرض الحقنة هو منع الشعور بالألم أو علاجه ، ولكنها لن تتسبب في نومك.

3. التحضير للإجراء
 يقوم قسم التصوير الطبي بإعطائك التعليمات المتعلقة بكيفية التحضير لهذا الإجراء.

نرجو إبلاغ الموظفين إن كنت حاملاً أو تشكين في كونك حاملاً ، أو إن كنت تمارسين الرضاعة الطبيعية.

إن كنت تتناول أيأ من الأدوية التي تزيد من سيولة الدم كالأسبرين ، وارفارين ، كلوبيدوجريل(بلافيكس أو اسكوفير) أو دايبييردامول(بيرسانتين أو اساسانتين) أو أي عقار آخر لنفس الغرض ، فاسأل طبيبك إن كان عليك التوقف عن تناولها قبل الإجراء لأنها قد تؤثر على تخثر دمك.

احضر معك كل الأدوية الموصوفة لك ، والأدوية التي تبتاعها دون وصفة ، والعلاجات العشبية والعلاجات التكميلية أو احضر قائمة بها.

لا تحتسي الكحوليات وأوقف تعاطي كل الأدوية والعقاقير المخدرة(المخالفة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

over the counter, herbal remedies and supplements

Do not drink any alcohol and stop recreational drugs 24 hours before the procedure as these may alter the affects of the sedation anaesthetic. If you have a drug habit please tell your doctor. (These activities are forbidden by Shariah Law)

4. During the procedure

A local anaesthetic is injected into the soft tissues of your lower back.

A spinal needle is put into your back.

While the needle is inserted try not to move or cough suddenly.

X-ray images are taken to guide the needle into the spinal canal.

An Oncology doctor will inject the chemotherapy drugs through the needle and into your spinal fluid.

The needle is removed from your back and a dressing is applied.

5. After the procedure

You may need to lie flat for a period of time to reduce the risk of a headache. This is at the discretion of the doctor.

Take care when you first stand, as temporary leg weakness can occur.

6. What are the risks of this specific procedure?

The risks/complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Headache may require medication and bed rest.
- Minor pain, bruising and/or infection at the injection site. This may require treatment with antibiotics.
- Low blood pressure causing dizziness. Bed rest can help relieve this.
- Bleeding or bruising could occur. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- Failure of local anaesthetic which may require a further injection of anaesthetic or a different method of anaesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time.

Less common risks and complications include:

- A severe headache, may need to have bed rest for several days. Sometimes other procedures are required to be done to relieve this headache.
- Vomiting may occur and require treatment with medication.

للسريعة الإسلامية) التي تتناولها ، وذلك قبل 24 ساعة من الإجراء ، لأنها قد تتداخل مع عمل الدواء المسكن. إذا كنت معتاداً على عقار معين ، نرجو إبلاغ الطبيب.

4. أثناء الإجراء

يتم حقن المخدر الموضعي في الأنسجة الرخوة في أسفل ظهرك.

يتم وضع إبرة العمود الفقري في ظهرك . حاول أن لا تتحرك أو تسعل فجأة عند إدخال الإبرة في ظهرك.

تؤخذ صور بالأشعة السينية لتوجيه الإبرة إلى قناة العمود الفقري.

يقوم طبيب الأورام بحقن العلاج الكيميائي من خلال الإبرة في السائل الشوكي. تتم إزالة الإبرة من أسفل الظهر ويوضع الضماد.

5. بعد الانتهاء من الإجراء

قد يكون من الضروري أن تظل مستلقياً بشكل مسطح لبعض الوقت للتقليل من مخاطر الصداع. يكون ذلك حسب ما يراه الطبيب.

كن حذراً عندما تبدأ بالوقوف لأنه قد يكون هناك ضعف مؤقت في الساقين.

6. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

مخاطر ومضاعفات هذا الإجراء تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- صداع قد يتطلب أدوية وراحة تتطلب البقاء في الفراش.
- ألم بسيط ، كدمة و/أو عدوى عند منطقة دخول الإبرة الوريدية . قد يتطلب المعالجة بمضادات حيوية.
- انخفاض في ضغط الدم بسبب دوخة . الراحة ولزوم الفراش قد يخفف من ذلك.
- حدوث نزيف أو كدمة . وهو أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل(بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول(بيرسانتين أو اساسانتين).
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى أو استخدام طريقة تخدير أخرى.
- ضرر لعصب . غالباً ما يكون مؤقتاً ومن المفترض تحسنه مع الوقت.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- صداع شديد قد يتطلب لزوم الفراش للراحة لعدة أيام . أحياناً يتطلب الأمر القيام ببعض الإجراءات لعلاج هذا الصداع.
- قد يحدث قيء يتطلب العلاج بأدوية.
- عدوى يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- ضرر الأنسجة المجاورة كالأوعية الدموية ، الأعضاء الأخرى والعضلات. يتطلب معالجات أخرى.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- An allergy to injected drugs may occur, requiring further treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- Injury to the spinal cord. This may require surgery.
- Permanent nerve damage with possible paralysis.
- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anaesthetic toxicity.
- Meningitis requiring antibiotics and other treatment.
- Death as a result of this procedure is very rare.

7. What are the safety issues when you leave hospital?

Take care not to injure or bump the area that has been numbed with the local anaesthetic as you will not be able to feel it. Go to your nearest Emergency Department or GP if you become unwell or have;

- Pain, unrelieved by simple pain killers.
- Unresolved nausea or vomiting.
- Continuous bleeding or swelling at the puncture site.
- Redness or inflammation at the puncture site headache that last more than a few hours.
- Fever.
- Other warning signs the doctor may have asked you to be aware of.

Notes to talk to my doctor/health practitioner about:

- تفاعل تحسسي للأدوية التي أعطيت أثناء القيام بالإجراء تتطلب علاجات أخرى.
- قد لا يمكن القيام بالإجراء لأسباب طبية وأو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- ضرر للحبل الشوكي . قد يتطلب ذلك جراحة.
- ضرر دائم لعصب واحتمال شلل.
- زيادة معدل خطر الإصابة بالسرطان خلال الحياة بسبب التعرض للأشعة السينية.
- تشنجات و \ أو سكتة قلبية بسبب سمية المخدر الموضعي.
- التهاب السحايا مما يتطلب مضادات حيوية وعلاجات أخرى.
- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً .

7. ما هي الأمور المتعلقة بالسلامة بعد مغادرة المستشفى؟

احذر من أن تصاب المنطقة التي تم تخديرها بالمخدر الموضعي بأي إصابة أو ارتطام لأنه لن تكون لديك القدرة على الشعور بذلك. توجه لأقرب قسم طوارئ أو لطبيبك العام إذا شعرت بأنك لست على ما يرام أو عانيت أي مما يلي:

- ألم لا يتعافى باستخدام مضادات الألم المعتادة.
- غثيان وقيئ مستمران.
- نزيف مستمر أو تورم في منطقة إدخال الأبرة.
- احمرار أو التهاب في موضع إدخال الإبرة.
- صداع مستمر لأكثر من بضع ساعات.
- ارتفاع في درجة الحرارة.
- ظهور أي علامات أخرى كان الطبيب قد نبهك إليها.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي :
