

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Paraphimosis Repair

معلومات الإقرار - نسخة المريض جراحة إصلاح الجلد المشدود في مقدمة العضو الذكري

1. What do I need to know about this procedure?

A paraphimosis repair is the surgical repair of the skin, which has tightened at the end of the penis.

2. My anesthetic

This procedure will require an anesthetic.

See **About Your Anesthetic information sheet** for information about the anesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and

1. ما الذي ينبغي علي معرفته عن هذا الإجراء؟
في هذا الإجراء الجراحي ، يتم إصلاح الجلد المشدود في مقدمة العضو الذكري.

2. التخدير الذي أتلقاه
سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ ورقة معلومات التخدير المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟
هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقصورة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبيير دامول (بيرسانتن أو اساسانتين).
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.

- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- It may be necessary to slit the skin to allow repair.
- A circumcision may be necessary in the future.
- Swelling in the shaft of the penis and in the foreskin. This will settle in time.
- Bleeding
- Infection

Notes to talk to my doctor about:

يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من الجلطة ليصل إلى الرئة.
• الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- قد يكون من الضروري عمل شق (قطع) في الجلد لتتم عملية الإصلاح.
- قد تكون هناك ضرورة لعمل الختان مستقبلاً.
- تورم في جسم العضو الذكري وفي جلد مقدمة العضو الذكري . يختفي ذلك مع مرور الوقت.
- نزيف
- التهابات

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
