

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Reduction Mammoplasty

جراحة تصغير الثدي التجميلية

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure.
(Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following procedure will be performed:
This procedure removes some breast tissue from either one or both breasts.
The breast, breast tissue and the skin will also be surgically re-fashioned, so that the nipple will be elevated and the shape of the breast improved.

C. Risks of a reduction mammoplasty

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing

ا- المترجم / الاحتياج الثقافي
هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟ ☐ لا ☐ نعم
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم حاضر ؟ ☐ لا ☐ نعم

ب . الحالة المرضية والعلاج
لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
يتم في هذا الإجراء إزالة بعض نسيج الثدي ، وذلك من أحد الثديين أو كلاهما.
يتم أيضاً إعادة التشكيل الجراحي للثدي ، نسيج الثدي والجلد بحيث يتم رفع حلمة الثدي وتحسين مظهر الثدي.

ج. مخاطر جراحة تصغير الثدي التجميلية

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين ، الأسبرين ، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبيرودامول (بيرسانتن أو اساسانتين).
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة ، مما يزيد من

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.

- Increased risk in obese people of wound infection, infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Perfect symmetry between the two breasts cannot be guaranteed.
- There will be significant and obvious scars in the early months after the surgery, which will reduce with time.
- Occasionally scars may become very thickened, red and painful. These can be disfiguring.
- Sensation of the nipple may be affected. This can range from being complete loss through to mild reduction in sensation.
- Breakdown in the wound edges, particularly near the junctions of the up/down and crosswise scars. This is treated with regular dressings until healed.
- There will be swelling and the healing of the wound may be slow. It may spoil the intended result of the surgery.
- Infection. The wound becomes red and/or painful after discharge. This can lead to delay or complete failure of the healing process This may need treatment with antibiotics and further surgery to drain the infection. This may have an adverse outcome on the results of the surgery.
- Bleeding, causing collection of blood under the skin and breast tissue. This may need further

مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.

- عند عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- لا يمكن ضمان حدوث التطابق والتماثل الكامل بين الثديين.
- ستكون هناك ندوب كبيرة وواضحة خلال الأشهر الأولى التي تعقب الجراحة والتي تقل مع مرور الوقت.
- أحياناً قد تصبح الندوب سميكة جداً ، حمراء اللون ومؤلمة. قد يسبب ذلك تشوهاً.
- قد يتأثر الإحساس في حلمة الثدي ويتراوح ذلك ما بين فقدان الكامل للإحساس إلى النقص البسيط في الإحساس.
- انفصال في جوانب الجرح وخاصةً بالقرب من مناطق التقاء الندب الممتد لأعلى وأسفل والندب العرضي. يعالج ذلك بالتضميد المنتظم حتى يحدث الالتئام.
- يحدث انتفاخ وتورم ، وقد يكون التئام الجرح بطيئاً. قد يفسد ذلك النتيجة المنتظرة من الجراحة.
- العدوى. يصبح الجرح أحمر اللون وأو مؤلم بعد خروج الإفرازات. قد يؤدي ذلك إلى تأخر أو الفشل الكلي لعملية الالتئام. قد يتطلب ذلك العلاج بالمضادات الحيوية وجراحة أخرى لتجفيف وتصريف العدوى. قد يسبب ذلك أثراً سلبياً على نتائج الجراحة.
- النزيف : قد يسبب النزيف تجمع للدم تحت الجلد و تحت نسج الثدي. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى. سيكون هناك انتفاخ وتورم ، وقد يكون التئام الجرح بطيئاً. قد يفسد ذلك النتيجة المنتظرة من الجراحة.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

surgery. There will be swelling and healing of the wound may be slow. It may spoil the intended result of the surgery.

- Some of the breast tissue may die due to poor circulation, more likely in patients with very large breasts and patients with very poor circulation. The size and shape may be altered in order to maintain an adequate circulation.
- Inability to breastfeed due to re-positioning of the nipples.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed).

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed

- قد يحدث موت لبعض من نسيج الثدي بسبب ضعف الدورة الدموية . يحدث ذلك غالباً عند المرضى الذين لديهم أداء كبيرة جداً والمرضى الذين لديهم دورة دموية ضعيفة جداً . قد يتم تغيير حجم وشكل الثدي من أجل الحصول على تدفق دموي كافٍ.
- عدم القدرة على ممارسة الرضاعة الطبيعية بسبب تغيير موضع حلمة الثدي.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير . (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.

- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

☐ **About Your Anaesthetic**

☐ **Reduction Mammoplasty**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed investigation and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with

العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقفاً. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسين حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

- نوعية التخدير المقدم لي
- جراحة تصغير الثدي التجميلية

• منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

• أفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعني لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

my doctor.

- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my investigation and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار

يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك القدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

القرار:

التوقيع:

صلته بالمريض:

التاريخ: الوقت:

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

توقيع الشهود :

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____