
CXCL12→CXCR4 CAF→T_cell: edge E z (large = p+1<.05; black edge = BH<.05)
10^1
10^0
0
-10^0
marker
author_mapped
protein_gmm
protein_mad
consensus_T
T1-b
T2-b
T3-b
T4-a
T4-b
T5-a
T6-b
U1-b
U2-b
U3-b
U4-a
U4-b
U5-a
U6-a_1
U6-a_2
U7-a


CXCL12→CXCR4 CAF→T_cell: ratio Q = E/M z (large = p+1<.05; black edge = BH<.05)
4
2
0
−2
−4
−6
marker
author_mapped
protein_gmm
protein_mad
consensus_T
T1-b
T2-b
T3-b
T4-a
T4-b
T5-a
T6-b
U1-b
U2-b
U3-b
U4-a
U4-b
U5-a
U6-a_1
U6-a_2
U7-a


Spearman of z on shared rows, 16 sections
author_mapped vs consensus_T
author_mapped vs protein_gmm
author_mapped vs protein_mad
marker vs author_mapped
marker vs consensus_T
marker vs protein_gmm
marker vs protein_mad
protein_gmm vs consensus_T
protein_gmm vs protein_mad
protein_mad vs consensus_T
0.97
0.95
0.35
0.19
0.31
0.19
0.66
0.39
0.66
0.41
0.45
0.34
0.45
0.39
0.35
0.19
0.83
0.81
0.31
0.19
edge
ratio
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0