



## MASTER DE MATHÉMATIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA DÉCISION

### **Modélisation du système manguier – cécidomyies des fleurs pour une évaluation de modes de gestion du ravageur et de ses dégâts**

Bastien Reyné

Encadré par : Isabelle Grechi (Cirad, UPR HortSys)  
Frédéric Boudon (Cirad, UMR AGAP)



Année universitaire 2018/2019



## **Résumé**

Résumé en français



# Remerciements

Merci !

# Table des matières

<b>Remerciements</b>	<b>iii</b>
<b>Table des matières</b>	<b>iv</b>
<b>1 Introduction</b>	<b>1</b>
<b>2 Connaissances biologiques</b>	<b>3</b>
2.1 Le mangueier . . . . .	3
2.2 La cécidomyie des fleurs . . . . .	5
<b>3 Expérimentation réalisée et données disponibles</b>	<b>7</b>
3.1 Dispositif . . . . .	7
3.2 Données . . . . .	8
<b>4 Le modèle</b>	<b>13</b>
4.1 Hypothèses . . . . .	13
4.2 Formalisme . . . . .	14
4.3 Inflorescences . . . . .	15
<b>5 Calibration du modèle</b>	<b>17</b>
5.1 Fonction de coût . . . . .	17
5.2 Analyse de sensibilité . . . . .	18
5.3 Algorithme d'optimisation . . . . .	20
5.4 Exploration de l'ensemble des solutions . . . . .	21
<b>6 Mise en œuvre et résultats</b>	<b>23</b>
<b>7 Conclusion</b>	<b>25</b>
<b>Bibliographie</b>	<b>27</b>
<b>A Verger n°2</b>	<b>29</b>

# 1

## Introduction

Le Cirad — où j'ai effectué mon stage — est un organisme de recherche spécialisé dans l'agronomie des régions tropicales et subtropicales, et l'un de ses objectifs principaux est d'encourager le développement durable desdites régions. Cependant la notion de développement durable vient avec quelques contraintes. Notamment, la durabilité implique la limitation des pesticides ; et le développement induit la nécessité d'une production agricole efficiente, capable de nourrir dix milliards de personnes d'ici 2050.

Ainsi, il est naturel que le sixième fruit le plus produit au monde, à savoir la mangue<sup>1</sup>, soit un sujet de recherche. C'est d'autant plus vrai que la culture du manguier (*Mangifera indica L.*) n'est pas toujours facile. En effet, les manguiers présentent de forts asynchronismes phénologiques, que ce soit à l'intérieur d'une même parcelle entre les différents arbres ou à l'intérieur même d'un arbre entre les différentes branches. Cela entraîne une floraison et une fructification étalée dans le temps, rendant la gestion des vergers plus difficile. Ce phénomène entraîne aussi, pour les différents organes du manguier, une fenêtre d'exposition prolongée aux bioagresseurs, ce qui favorise leur prolifération. Et ils sont légion. On peut citer la cécidomyie des fleurs et la mouche des fruits chez les ravageurs ou encore l'oïdium, une maladie fongique.

Parmi ces ravageurs la cécidomyie des fleurs (*Procontarinia mangiferae*) peut fortement impacter la production. Cette dernière pond ses œufs dans les inflorescences, ce qui provoque des dommages potentiellement importants voire la mort des inflorescences. Et qui dit pas d'inflorescences, dit pas de mangues ! Dans le contexte de développement durable, il s'agit donc de trouver des solutions alternatives aux pesticides pour gérer ce ravageur et ses dégâts.

Pour ce faire, deux pistes sont envisagées. La première serait la synchronisation de la floraison, grâce à des pratiques culturales appropriées (la taille, par exemple), ce qui réduirait la fenêtre d'exposition aux ravageurs et limiterait par conséquent leur nombre, en limitant notamment le nombre de cycle de développement du ravageur à l'intérieur du verger. La seconde repose sur le fait que les œufs pondus dans les inflorescences se transforment en larves qui vont ensuite s'enfouir dans le sol. Restreindre l'accès au sol (avec un enherbement haut par exemple, qui augmente le trajet des larves pour atteindre la terre et favorise la présence de prédateurs) ou l'empêcher (e.g. en utilisant une bâche)

---

1. La sixième production fruitière mondiale est en réalité le groupement des mangues, mangoustans et goyaves [Food and Agriculture Organization, 2017]

devrait *a priori* permettre de réduire la présence de ces ravageurs. Afin de pouvoir vérifier cette hypothèse, une expérimentation sur un verger a été conduite en 2017; une parcelle a été divisée en trois sous-parcelles pour tester trois modalités de couverture du sol différentes : un enherbement ras, un paillage synthétique et un enherbement haut. De cette expérimentation, des données ont été acquises. L'objectif est de modéliser les interactions entre les cécidomyies et les inflorescences en utilisant les données acquises pour calibrer le modèle. Une première version du modèle a été réalisée lors du stage de [Saint-Criq \[2018\]](#). Mon stage en est la suite et a pour objectifs :

1. la compréhension du fonctionnement du système manguier – cécidomyies ;
2. tester *in silico* l'effet de la dynamique de floraison et de conditions environnementales, telles que la pression exogène du ravageur, sur l'infestation du verger par les cécidomyies des fleurs.

[BALANCER LE PLAN]

# 2

## Connaissances biologiques

On s'intéresse dans ce chapitre au manguier et à la cécidomyie des fleurs. On s'intéresse en particulier à leurs descriptions d'un point de vue biologique, leurs développements et leurs interactions. Autrement dit, on recense ici les connaissances biologiques nécessaires à la compréhension de notre sujet.

### 2.1 Le manguier

Le manguier est un arbre qui a un *cycle phénologique* qui lui est propre. On désigne par cycle phénologique les phénomènes périodiques qui rythment le développement du monde vivant en fonction des variations climatiques saisonnières. Si l'on observe toujours les mêmes étapes, à savoir une croissance végétative suivie d'une floraison puis d'une fructification et enfin un repos végétatif (avant de recommencer), il est nécessaire de noter qu'il y a chez le manguier, en sus des conditions climatiques, d'autres facteurs qui influent sur la phénologie tels que la position de l'unité de croissance ou la charge en fruit de l'année précédente [Magne, 2004; Normand *et al.*, 2009]. Il en résulte que le cycle phénologique est très variable d'un manguier à l'autre. On observe même des différences au niveau d'un même arbre. Cela implique aussi que le cycle phénologique peut être modifié (dans une certaine mesure) grâce à des opérations techniques, comme la taille par exemple. Mais il subsiste toujours une phénologie étalée dans le temps à l'échelle d'un verger, on parle alors d'asynchronismes phénologiques. Quand cet étalement concerne des stades sensibles aux ravageurs, lors de la floraison par exemple, cela implique une disponibilité en ressources assez longue pour les ravageurs, et peut expliquer leur forte présence.

La croissance végétative du manguier est dite rythmique. Cela signifie que sa croissance est entrecoupée par des périodes de repos. Durant les périodes de croissance, les branches sont prolongées à leur extrémité par des axes feuillés. Ces axes sont appelées *unités de croissance*. Au fil du temps, les unités de croissance perdent leurs feuilles, durcissent et grossissent jusqu'à faire partie intégrante de la branche. On peut alors voir le manguier comme un empilement d'unités de croissance ; la base du tronc étant l'unité de croissance la plus ancienne et celles qui portent des feuilles les plus récentes [Normand, 2009]. Des unités de croissance sont visibles sur la figure 2.1.




FIGURE 2.1 – Photographie d'une branche portant des unités de croissance. Les flèches rouges montrent des unités de croissances. Les flèches bleues montrent les délimitations des unités de croissance antérieures ; la portion de la branche entre deux flèches bleues correspond à une ancienne unité de croissance qui a perdu ses feuilles, grossie et durcie et qui fait désormais partie intégrante de la branche.

Et ce sont ces unités de croissance qui portent les *inflorescences*. Les inflorescences désignent des groupements de bourgeons. De façon plus formelle, ce sont des «panicules pyramidales pouvant mesurer jusqu'à 30 cm». Ces bourgeons se comptent par centaines voire milliers pour chaque inflorescence. Ils deviennent des fleurs mâles ou hermaphrodites. Ces dernières deviennent des fruits, si elles sont fécondées. En théorie. En pratique, une très faible proportion donnera des fruits. Même sans ravageurs et avec de bonnes conditions climatiques, il y a rarement plus de cinq fruits par inflorescence. Par contre si les conditions sont défavorables, beaucoup d'inflorescences peuvent ne pas produire de fruit du tout. Une photographie d'inflorescence est visible sur la figure 2.2.



FIGURE 2.2 – Une inflorescence (photo : F. Normand)

Du cycle phénologique viennent les *stades phénologiques* des inflorescences. Ils caractérisent le niveau de développement des inflorescences. On considère ici les stades phénologiques allant de C à F. Le stade C correspond au débourrement (l'éclosion des bourgeons) de l'inflorescence. Le stade F s'étend entre l'apparition de la première fleur jusqu'à la disparition de la dernière. Et les stades D et E représentent les étapes intermédiaires du développement qui mènent du débourrement à la floraison d'une inflorescence. Les durées des stades phénologiques sont les suivantes :

Stade phénologique	C/D	E	F
Durée (en jours)	7	9	34

Les inflorescences ont ainsi une durée de vie théorique de 50 jours [Saint-Criq, 2018]. Cette durée théorique peut être réduite en cas d'attaque de cécidomyies des fleurs, surtout lorsque l'inflorescence se fait attaquer lors des premiers stades, moment où elle est la plus vulnérable.

À la Réunion, les inflorescences commencent à apparaître en juillet, les premiers fruits apparaissent à la mi-septembre. La récolte a lieu de décembre à janvier. Ces dates varient en fonction de la zone géographique.

## 2.2 La cécidomyie des fleurs

Les cécidomyies des fleurs sont des diptères (des sortes de moucherons) dont le manguiier est la seule plante-hôte. À la Réunion, les cécidomyies sont présentes toute l'année et se reproduisent sur les inflorescences et les jeunes feuilles [Amouroux, 2013]. Le nombre maximal est atteint pendant la période de floraison.

Le cycle de développement de la cécidomyie des fleurs est schématisé sur la figure 2.3. Les femelles présentes dans le verger au jour  $t$  peuvent pondre jusqu'à 150 œufs dans les inflorescences. Les œufs laissent place à des larves. Au bout de sept à douze jours après la ponte, une fois le troisième stade de développement larvaire atteint, les larves s'éjectent des inflorescences en direction du sol. (Et ce développement larvaire qui provoque des dégâts sur les inflorescences car les larves consomment le tissu végétal et creusent des galeries, fragilisant ainsi les inflorescences.) Une fois au sol, les larves s'enfouissent dans le sol. Elles peuvent alors entrer en phase de *pupaison*, qui correspond à la transformation de la larve en cécidomyie. Cette phase dure quatre à six jours, et une fois finie les cécidomyies adultes émergent du sol et infestent le verger — perpétuant ainsi le cycle. Une fois adultes, leur durée de vie n'excède pas 72 heures.

Alternativement à la pupaison, les larves peuvent aussi rentrer en *diapause*. La diapause peut être vue comme une sorte d'hibernation, où le cycle est mis en pause un an ou deux avant l'émergence de la cécidomyie adulte.

Les individus qui sortent de diapause permettent notamment le lancement de la dynamique d'infestation pendant la période de floraison. La sortie est dû à une baisse de température qui coïncide avec le début de la floraison [Amouroux *et al.*, 2014].




FIGURE 2.3 – Représentation du cycle de développement de la cécidomyie des fleurs du mangue par Amouroux *et al.* [2009].

# 3

## Expérimentation réalisée et données disponibles

Ce chapitre explique l'expérimentation qui a été menée en 2017 sur deux vergers dans la commune de Saint-Paul (à la Réunion). On reviendra sur le dispositif de l'expérimentation et les données qui en ont été tirées. Le but de cette expérimentation était de déterminer quel est l'impact de la modalité de couverture du sol dans le degré d'infestation d'un verger.

### 3.1 Dispositif

Le verger expérimental (que l'on appellera aussi parcelle par la suite) n°1 a une superficie de 0.33 hectares et est séparé en trois sous-parcelles de tailles égales de trente arbres. Sur chacune des trois sous-parcelles, une modalité de couverture du sol différente est mise en place. Sur un côté il y avait un enherbement entretenu de sorte qu'il reste ras, la modalité *enherbement ras* (*ER*) fera référence à ce traitement dans la suite du document. La sous-parcelle du milieu fut bâché, afin que les cécidomyies ne puissent ni entrer dans le sol ni en sortir ; cette modalité correspond au *paillage synthétique* (*PS*). La dernière partie fut laissée telle quelle, sans entretien particulier, donnant ainsi un *enherbement haut* (*EH*). À noter qu'à côté de ce verger, il y en avait un autre. Bien que cet autre verger n'avait aucun rôle particulier, il a probablement servi de source d'infestation exogène au verger expérimental. Tout cela est schématisé sur la figure 3.1. Le dispositif sur la parcelle n°2 est décrit dans l'annexe A.

Sur ces deux vergers expérimentaux, deux types d'observations furent effectués entre juin et octobre 2017. Le premier porte sur les inflorescences. Huit unités de croissance furent sélectionnées sur chacun des vingt-cinq arbres échantillonés aléatoirement dans chacune des trois sous-parcelles. Et c'est ainsi qu'entre le 26 juin et le 3 octobre 2017 furent notés les dates de débourrements des inflorescences présentes sur les deux cents unités de croissance suivies. À partir du 6 septembre furent aussi notées les dates de morts des inflorescences. Les données de ce relevé seront rassemblées en un jeu de données que l'on nommera *dataset 1*.




FIGURE 3.1 – En haut, photographie des trois modalités : enherbement ras, paillage synthétique et enherbement haut. En bas, schéma de l’expérimentation menée. Le verger sur lequel ont été testées les trois modalités de couvertures du sol était situé à côté d’un autre verger. Bien que cet autre verger n’avait pas de rôle particulier, il a probablement servi de source d’infestation exogène au verger expérimental.

La seconde catégorie d’observations porte sur la capture des larves de cécidomyies. Dans chacune des trois sous-parcelles, dix arbres furent sélectionnés. Sous chacun de ces arbres furent placés deux pièges en dessous des inflorescences présentes. Les pièges sont des bidons plastiques carrés de douze centimètres de côté remplis d’eau. À noter que les pièges furent déplacés au cours du temps pour qu’ils soient toujours en-dessous d’inflorescences. Et c’est ainsi qu’entre le 18 juillet et le 6 octobre 2017 furent notés le nombre de larves piégées, le nombre d’inflorescences vivantes au-dessus du piège et le nombre d’inflorescences vivantes dans l’arbre. Les données de ce relevé seront rassemblées en un jeu de données que l’on nommera *dataset 2*.

## 3.2 Données

Après mise en forme des données<sup>1</sup>, on peut extraire les dynamiques qui nous intéressent. Il faut cependant noter que les deux jeux de données n’ont pas la même échelle. On choisira de tout mettre à l’échelle de la sous-parcelle.

### Inflorescences vivantes

On peut extraire les dynamiques d’inflorescences vivantes grâce aux deux jeux de données : elles seront notées  $I_t^1$  pour le *dataset 1* et  $I_t^2$  pour le *dataset 2*. Pour le *dataset*

---

1. Tous les scripts utilisés sont disponibles à l’adresse <https://github.com/bastienreyne/cecidomylie>

2, c'est facile. On possède le nombre d'inflorescences vivantes dans les arbres suivis aux différentes dates ; il suffit alors de mettre à l'échelle comme suit :

$$I_t^2 = \frac{N}{n} \sum_{k=1}^n I_{k,t}^2,$$

avec  $N$  représentant le nombre d'arbre dans la sous-parcelle,  $n$  le nombre d'arbre suivis et  $I_{k,t}^2$  le nombre d'inflorescences sur l'arbre  $k$  à la date  $t$ . À noter que les relevés n'ont pas été effectués à chaque date  $t$ , le nombre d'inflorescences vivantes entre deux relevés effectif est alors le résultat d'une interpolation linéaire entre lesdits relevés.

Pour le *dataset 1*, on possède le nombre de débouvements journalier  $B_t$  et le nombre de morts journalier  $D_t$ . Le nombre d'inflorescences vivantes au jour  $t$  s'écrit alors

$$I_t^1 = \alpha \left( \sum_{j=1}^t B_j - \sum_{j=1}^t D_j \right),$$

où  $\alpha$  représente le coefficient de mise à l'échelle pour passer de deux cents unités de croissance à la sous-parcelle. Il faut cependant apporter une correction à cette dynamique. En effet, l'observation des inflorescences mortes n'a été faite qu'à partir du 6 septembre. De ce fait, sur ce jeu de données la distinction entre inflorescences vivantes et mortes n'est possible qu'à partir du 6 septembre. Il en résulte une forte diminution du nombre d'inflorescences entre le 5 et le 6 septembre (voir figure 3.2). Cet écart correspond au nombre de mort cumulé jusqu'au 6 septembre, et qu'il faut donc répartir sur la période concernée. N'ayant aucune indication de comment la répartir, on utilisera la dynamique d'inflorescences vivantes du *dataset 2* afin que la dynamique du *dataset 1* y ressemble le plus possible — et on en profitera au passage pour estimer le coefficient de mise à l'échelle  $\alpha$ . Plus précisément, on attribuera un poids (à calibrer numériquement) pour tous les jours entre le jour 1 et le 5 septembre, et le nombre de morts chaque jour sera donné par la formule

$$D_t^c = \frac{p_t \times m}{\sum_j p_j},$$

où  $D_t^c$  désigne le nombre de mort à la date  $t$ ,  $m$  le nombre de mort total déterminé par la différence d'inflorescences entre le 5 et 6 septembre et  $p_t$  le poids assigné au jour  $t$ . Les poids  $p_t$  et le coefficient de mise à l'échelle  $\alpha$  seront déterminés numériquement afin de résoudre le problème

$$\arg \max_{\alpha, p_t} \sum_t |I_t^2 - I_t^{1,c}|,$$

où  $I_t^{1,c}$  représente les inflorescences vivantes du *dataset 1* mises à l'échelle et corrigées ; cette dynamique est déterminée par la formule

$$I_t^{1,c} = \begin{cases} I_t^1 - D_t^c & \text{si } t \leq 6 \text{ septembre,} \\ I_t^1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Les différentes dynamiques d'inflorescences sont visibles sur la figure 3.2. On remarque des dynamiques très différentes pour la modalité «enherbement haut», et ce même après correction de la dynamique issue du *dataset 1*. On peut expliquer ce phénomène par la grande variabilité de la phénologie chez le manquier ; ainsi des échantillonages différents peuvent produire des dynamiques très différentes. Les deux autres modalités ont en revanche des dynamiques similaires (après correction).

On fera le choix de privilégier, à chaque fois que cela s'avérera possible, les dynamiques issues du *dataset 2*. Ce choix découle du fait que ce sont les dynamiques associées aux dynamiques de larves.




FIGURE 3.2 – Comparaison des différentes dynamiques d’inflorescences vivantes du verger n°1 en fonction du *dataset* utilisé. Si après correction les dynamiques des deux *datasets* sont similaires pour les deux premières modalités, la modalité «enherbement haut» présente des différences significatives entre les deux dynamiques. Cela peut s’expliquer par un échantillonage différent d’un phénomène présentant une grande variabilité.

## Larves

Le *dataset* 2 permet aussi de récupérer la dynamique de larves, à partir des larves piégées. En effet, on connaît le nombre de larves par piège, le nombre d’inflorescences vivantes situées au-dessus des pièges et le nombre d’inflorescences vivantes dans les arbres suivis. De là, on peut estimer le nombre de larves qui s’éjecte des inflorescences à l’échelle d’un arbre, puis à l’échelle de la sous-parcelle. Il y a cependant ici une subtilité : le relevé des pièges n’est pas quotidien, il faut donc répartir le nombre de larves piégées entre deux relevés effectifs sur la période entre lesdits relevés. La dynamiques de larves peut donc s’obtenir en utilisant la formule

$$L_t = \frac{N}{n} \left( \sum_{k=1}^n L_t^k \times \frac{I_{k,t}^2}{I_{k,p}^2} \right),$$

où  $N$  représente le nombre d’arbre dans la sous-parcelle,  $n$  le nombre d’arbre suivis,  $I_{k,t}^2$  le nombre d’inflorescences sur l’arbre  $k$  à la date  $t$ ,  $I_{k,p}^2$  le nombre d’inflorescences au-dessus des pièges dans l’arbre  $k$  à la date  $t$  et on définit  $L_t^k$  par

$$L_t^k = \frac{L_{k,t}^j}{t_j - t_{j-1}},$$

avec  $t_j$  le nombre de jours entre la première observation et le  $j^{\text{ème}}$  relevé et  $L_{k,t}^j$  le nombre de larves dans les pièges de l’arbre  $k$  au  $j^{\text{ème}}$  relevé. Les différentes dynamiques de larves sont visibles sur la figure 3.3.

Les dynamiques pour le verger n°2 sont visibles dans l’annexe A.




FIGURE 3.3 – Dynamiques de larves s'éjectant des inflorescences des manguiers chaque jour dans le verger n°1 pour chacune des trois sous-parcelles. En gris sont visibles les dynamiques d'inflorescences vivantes (issues du dataset 2,  $I_t^2$ ).



# 4

## Le modèle

ON s'intéresse ici aux différentes approches possibles pour modéliser le phénomène. Et il y a du choix car il y a dans la littérature quelques modèles relatifs aux manguiers et aux cécidomyies. On décrira la solution retenue ainsi que les hypothèses faites.

Concernant la modélisation en rapport avec le manguier, on peut citer le modèle *Virtual Mango* développé par [Boudon et al. \[2016\]](#). C'est un modèle qui simule le développement du manguier, notamment sa croissance et les différents stades phénologiques des unités de croissance et des inflorescences. Le modèle ne prend cependant pas en compte l'impact des ravageurs sur le développement de l'arbre.

Plus en rapport avec notre sujet, on peut noter l'existence d'un modèle de colonisation d'un verger par les cécidomyies [\[Amouroux, 2013\]](#). Les données utilisées proviennent d'une expérimentation menée sur un verger entièrement bâché. C'est un modèle stochastique et spatialisé qui prend en compte l'arrivée des femelles sur le verger, leurs pontes d'œufs dans les inflorescences, le développement de ces derniers jusqu'au troisième stade de développement larvaire et enfin l'éjection des larves des inflorescences. Cependant, le fait que le verger modélisé est entièrement bâché implique l'absence de cycle de développement complet pour les cécidomyies à l'intérieur du verger ainsi que l'absence d'émergence de cécidomyies dans le verger.

On choisira ici l'approche amorcé par [Saint-Criq \[2018\]](#), qui propose une modélisation du verger expérimental avec à la fois venue de femelles exogènes et reproduction endogène, tout en prenant en compte les différentes modalités de couverture du sol. L'objectif sera de simuler les dynamiques de larves à l'échelle de la sous-parcelle en fonction du nombre d'inflorescences présentes.

### 4.1 Hypothèses

À cette fin, il convient de faire des hypothèses sur les processus biologiques qui régissent le développement des larves et des manguiers. Les voici :

- la modalité de couverture du sol n'influe pas sur le développement et la phénologie du manguier, elle n'influe pas non plus sur le déplacement des cécidomyies ;
- la durée de vie des femelles n'est que d'un jour, et il correspond au jour de la ponte ;

- aucune femelle ne rentre dans le sol ou ne sort du sol pour la sous-parcelle avec un paillage synthétique ;
- il y a un taux de mortalité pour larves lorsqu'elles rentrent ou sortent du sol, et ce taux est différent entre l'enherbement ras et l'enherbement haut ;
- les larves qui n'entrent pas en pupaison (soit qui meurent, soit qui rentrent en diapause) sont exclues du système ;
- la probabilité d'entrer en pupaison dépend de la température ;
- des larves entrées en phase de diapause l'année précédente émergent dans les sous-parcelles avec un enherbement ;
- un individu qui émerge dans une sous-parcelle peut se déplacer dans les autres, il y a cependant un coût relatif à la distance (autrement dit, les cécidomyies préfèrent rester dans la sous-parcelle dans laquelle elles émergent, puis aller dans la sous-parcelle limitrophe plutôt que dans la troisième) ;
- les femelles exogènes arrivent proportionnellement aux inflorescences ;
- s'il y a significativement plus de femelles que d'inflorescences, alors elles ne peuvent pas toutes pondre ;
- seuls les premiers stades phénologiques de l'inflorescence sont attractifs pour les cécidomyies.

## 4.2 Formalisme

En reprenant les hypothèses ainsi que le cycle de développement de la cécidomyie présenté dans la partie 2.2, on peut formaliser notre modèle. Le modèle cherche à prédire les larves qui s'éjectent des manguiers, seule quantité observée concernant les cécidomyies, ce qui permettra donc d'évaluer notre modèle.

Ainsi, le nombre de larves au jour  $t$  dans la sous-parcelle  $i$  est donnée par

$$L_{t,i} = F_{t-d_\ell, i} \times R \times E_0 \times \mu_\ell,$$

où  $F_{t-d_\ell, i}$  est le nombre de femelles dans la sous-parcelle  $i$  au jour  $t-d_\ell$ ,  $d_\ell$  est la durée entre la ponte et le troisième stade de développement larvaire,  $R$  un indicateur de disponibilité en ressources,  $E_0$  le nombre d'œufs pondus et  $\mu_\ell$  la probabilité de survie des œufs entre la ponte et le troisième stade de développement larvaire. Et on a  $R = \min\{1, kI_{t,i}/F_{t,i}\}$ , qui dit que s'il y a *significativement* plus de femelles que d'inflorescences, alors elles ne pourront pas toutes pondre. Le *significativement* est déterminé par le paramètre  $k$ .

Le nombre de larves en pupaison à la date  $t$  est donné par  $P_{t,i} = L_{t,i} \times \mu_{\text{sol}}^1 \times p_p$ , où  $\mu_{\text{sol}}^1$  est la probabilité d'une larve d'entrer dans le sol en fonction de la modalité de couverture du sol et  $p_p$  est la probabilité pour une larve d'entrer en pupaison. Le nombre de larves en diapause des années précédentes qui sort au jour  $t$  est donnée par  $D_{t,i}$ , qui sera estimé.

Le nombre de femelles émergeantes du sous-bloc  $i$  au jour  $t$  est donnée par

$$F_{t,i}^{\text{endo}} = F_{t,i}^{\text{pupe}} + F_{t,i}^{\text{diap}},$$

avec  $F_{t,i}^{\text{pupe}} = P_{t-d_p, i} \times \frac{1}{1+SR} \times \mu_{\text{sol}}^2$  le nombre de femelles issues de la reproduction locale de l'année et  $F_{t,i}^{\text{diap}} = D_{t-d_p} \times \frac{1}{1+SR} \times \mu_{\text{sol}}^2$  le nombre de femelles issues des femelles entrées en diapause les années précédentes. Et on a  $SR$  qui correspond au *sex-ratio* et  $\mu_{\text{sol}}^2$  à la probabilité pour une femelle de sortir du sol après la pupaison ou la diapause en fonction de la modalité de couverture du sol.

Les femelles qui émergent dans la sous-parcelle  $i$  n'y restent pas forcément, elles peuvent potentiellement aller dans la sous-parcelle  $j$  ou  $k$ . Ainsi, pour  $n \in \{i, j, k\}$ , on a

$$F_{t,i \rightarrow n}^{\text{endo}} = \frac{I_{t,n} \times p_m^\delta}{\sum_{\{i,j,k\}} I_{t,n} \times p_m^\delta},$$

avec  $p_m \in [0; 1]$  et  $\delta = \begin{cases} 0 & \text{si } n = i \text{ (même sous-parcelle),} \\ 1 & \text{si } n = j \text{ (sous-parcelle limitrophe),} \\ 2 & \text{si } n = k \text{ (sous-parcelle non-limitrophe).} \end{cases}$

Enfin, le nombre de femelles qui pond dans la sous-parcelle  $i$  à la date  $t$  est donné par

$$F_{t,i} = F_{t,i \rightarrow i}^{\text{endo}} + F_{t,(j,k) \rightarrow i}^{\text{endo}} + F_{t,i}^{\text{exo}},$$

où  $F_{t,(j,k) \rightarrow i}^{\text{endo}} = F_{t,j \rightarrow i}^{\text{endo}} + F_{t,k \rightarrow i}^{\text{endo}}$  est le nombre de femelles venant d'une autre sous-parcelle, et  $F_{t,i}^{\text{exo}}$  le nombre de femelles venant de l'extérieur dans la sous-parcelle à la date  $t$ . Le nombre de femelles exogènes est donné par  $F_{t,i}^{\text{exo}} = \gamma \times I_{t,i}$ , avec  $\gamma$  à déterminer.

Le schéma conceptuel du modèle est visible sur la figure 4.1.




FIGURE 4.1 – Schéma conceptuel du modèle pour la sous-parcelle  $i$ . En bleu est visible la date, la flèche en pointillés marque une rupture du temps.

### 4.3 Inflorescences

Le modèle prendra en entrée les inflorescences. Il faut cependant noter qu'il ne prendra pas les inflorescences «brutes», mais des dynamiques modifiées. En effet, on émet également l'hypothèse que les cécidomyies n'attaquent non pas les toutes les inflorescences mais uniquement celles se situant au stades phénologiques C, D ou E. Ce qui correspond aux

seize premiers jours de l'inflorescence. Pour parvenir à avoir lesdites dynamiques, on a besoin de procéder à quelques étapes intermédiaires. On a notamment besoin de la date de débourrements des inflorescences avant d'avoir une estimation des dynamiques voulues.

## Débourrements

Afin de pouvoir simuler des dynamiques d'inflorescences avec une durée de vie de seize jours, il est nécessaire d'avoir les dates de débourrements des inflorescences. Dans le verger n°1, les dynamiques pour les modalités «enherbement ras» et «paillage synthétique» issues des deux jeux de données ont des dynamiques plutôt similaires ; on pourrait donc utiliser les débourrements du *dataset 1* mis à l'échelle. En revanche, pour la modalité «enherbement haut», on observe des dynamiques très différentes. Et comme l'on souhaite privilégier les dynamiques issues du *dataset 2*, il faut procéder autrement. (Il en va de même pour les modalités «enherbement ras» et «paillage synthétique» du verger n°2.)

L'objectif est alors de simuler les dates de débourrements qui permettent de produire la dynamique d'inflorescences vivantes du *dataset 2*. Pour cela, on suppose que la durée de vie effective d'une inflorescence suit une loi normale. On possède les durées de vies effectives dans le *dataset 1*. Premièrement, en fixant le risque de première espèce à  $\alpha = 5\%$ , un test de normalité de Shapiro–Wilk nous confirme la normalité (*p*-valeur de 0.05447, on ne rejette donc pas l'hypothèse de normalité). Deuxièmement, on observe une durée de vie effective moyenne de 29 jours (avec un écart-type de 14). Ainsi, il faut donc simuler des débourrements, pour que des inflorescences ayant une durée de vie qui suit une  $\mathcal{N}(29; 14)$ , donne la dynamique d'inflorescences vivantes du *dataset 2*. Il faut donc trouver les  $B_t$  tels que

$$I_t^2 = B_t + \sum_{j=1}^{50} B_{t-j} \times (1 - F(j)), \quad \text{avec } B_t = 0 \text{ si } t \leq 0,$$

où  $F$  est la fonction de répartition d'une  $\mathcal{N}(29; 14)$ .

Par souci d'homogénéité, on utilisera les débourrements simulés pour les trois modalités, et ce pour les deux vergers.

## Dynamiques

Une fois les dates de débourrements obtenus, on peut simuler des dynamiques d'inflorescences aux stades phénologiques C, D et E. Ces inflorescences *attractives* peuvent se calculer en utilisant la formule

$$I_t^a = B_t + \sum_{t=1}^{16} B_{t-j} \times (1 - F(j)), \quad \text{avec } B_t = 0 \text{ si } t \leq 0.$$

Ici,  $B_t$  représente toujours le nombre de débourrements à la date  $t$  et  $F$  la fonction de répartition d'une  $\mathcal{N}(29; 14)$ .

# 5

## Calibration du modèle

Il est question ici de définir la méthodologie afin de calibrer les paramètres libres du modèle. On s'intéressera notamment à définir une fonction de coût, pour évaluer la qualité de la calibration. Dans cette optique, on essayera de calibrer les paramètres en utilisant uniquement les dynamiques du verger n°1 ; le deuxième servira à la validation.

Il peut être utile de donner la liste des paramètres à calibrer :

- $\gamma$ , le paramètre relatif à l'arrivée des femelles exogènes ;
- $p_m$ , le paramètre relatif à la migration des femelles endogènes entre les sous-parcelles ;
- $\mu_{ER}^1$  et  $\mu_{ER}^2$ , les probabilité de réussir à entrer et à sortir du sol pour les cécidomyies pour la modalité «enherbement ras». Pour simplifier, on pose  $\mu_{ER}^1 = \mu_{ER}^2$  ;
- $\mu_{EH}^1$  et  $\mu_{EH}^2$ , les probabilité de réussir à entrer et à sortir du sol pour les cécidomyies pour la modalité «enherbement haut». Ici aussi, on pose  $\mu_{EH}^1 = \mu_{EH}^2$  ;
- $k$ , le paramètre relatif à la disponibilité en ressources pour les inflorescences ;
- **stock**, le nombre de larves entrées en diapause les années précédentes qui décident de sortir l'année considérée ;
- $E_0\mu_\ell$ , le nombre d'oeufs pondus par une femelle qui survivent, se transforment en larves puis s'éjectent de l'inflorescences.

### 5.1 Fonction de coût

Avant une quelconque estimation des paramètres, nous avons besoin de mesurer la qualité de nos estimations. Pour ce faire, on utilisera une fonction pour comparer le nombre de larves estimées avec le nombre de larves observées. Pour définir cette fonction, on pose :

- $m$ , le nombre de jours entre la première observation et la dernière ;
- $n$ , le nombre de relevés effectif ;
- $t$ , le nombre de jours passés depuis la première observation ;
- $t^j$ , le nombre de jours entre la première observation et le  $j^{\text{ème}}$  relevé.

(On a donc  $t^1 = 0$  et  $t^n = m$ .)

La fonction est alors définie par

$$f(y, \hat{y}) = \sqrt{\frac{\frac{1}{n-1} \sum_{j=2}^n (y_j^* - \hat{y}_j^*)^2}{\max(y^*) - \min(y^*)}},$$

où

$$y_j^* = y_{t^j} \quad \text{et} \quad \hat{y}_j^* = \frac{1}{t^j - t^{j-1}} \sum_{k=t^{j-1}}^{t^j} \hat{y}_k.$$

La figure 5.1 illustre le fonctionnement de la fonction. Appliquer la fonction à  $n - 1$  valeurs (correspondant aux relevés sur le terrain) plutôt qu'à chacun des  $m$  jours (correspondant à l'étendue des relevés) est motivé par le fait que les relevés ne furent pas fait à des intervalles de temps régulier. Ce faisant, on évite d'attribuer plus d'importance aux relevés qui ont eu un écart relativement important avec le relevé précédent.




FIGURE 5.1 – Schéma illustrant le fonctionnement de la fonction objectif. À chaque relevé effectif (marqueurs verts), on fait correspondre la période correspondant à ce relevé (segments en pointillés). Et pour chacune de ces périodes, on calcule la moyenne des valeurs estimées (les croix rouges). On compare ensuite les moyennes ainsi calculées avec les valeurs observées associées (les croix bleues).

Par la suite, l'objectif sera de minimiser cette fonction pour chacune des trois sous-parcelles.

## 5.2 Analyse de sensibilité

Avant de calibrer le modèle, il est pertinent d'effectuer une analyse de sensibilité. L'analyse de sensibilité est définie par [Saltelli et al. \[2004\]](#) comme

«l'étude de comment l'incertitude de la sortie d'un modèle — qu'elle soit numérique ou non — peut être répartie entre les différentes sources d'incertitudes présentes dans les entrées du modèle.»<sup>1</sup>

1. «The study of how uncertainty in the output of a model (numerical or otherwise) can be apportioned to different sources of uncertainty in the model input.»

Autrement dit, on cherche à connaître les paramètres les plus influants sur la sortie du modèle. La calibration comportant toujours une part d'arbitraire, cette analyse permet de prendre du recul sur les choix de paramètres, relativement à leur impact sur le modèle. En particulier lorsque certains paramètres ne sont qu'approximatifs vis à vis de la réalité qu'ils ont vocation à décrire, mais fortement significatifs pour la sortie du modèle.

Il existe deux grandes catégories d'analyses de sensibilité, celles qui ont une approche globale et celles qui ont une approche locale (parfois appelées *one-at-the-time*). L'approche locale consiste à étudier la sensibilité des paramètres les uns après les autres, les uns indépendamment des autres. Cette approche est valable si et seulement si le modèle est linéaire par rapport à chacune de ses entrées  $x_i$  et qu'il n'y a aucune interaction entre les différentes entrées du modèle [Saltelli et al., 2019]. Dès lors qu'il y a la moindre incertitude sur la linéarité du modèle ou sur la non-interaction entre les paramètres, il faut privilégier une approche globale. Notre modèle n'est pas linéaire et il n'y a dans notre cas aucune raison de supposer la non-interaction entre nos paramètres, bien au contraire. On utilisera donc une approche globale.

Bien qu'il existe plusieurs méthodes ayant une approche globale, elles ont toutes en commun de fonctionner dans un cadre non-linéaire et de prendre en compte les différentes interactions entre les différents paramètres. Parmi les méthodes les plus connues et les plus utilisées, on peut en citer qui fonctionnent par décomposition de la variance comme Sobol ou FAST (Fourier Amplitude Sensitivity Test) ou d'autres qui fonctionnent en effectuant des perturbations élémentaires des entrées du modèle comme la méthode Morris. Notre modèle possède moins de 20 paramètres et s'exécute en moins d'une minute, nous utiliserons alors la méthode Sobol conformément aux recommandations de Saltelli et al. [2008, chap. 6].

Le fonctionnement de cette méthode est relativement intuitif. On considère que la sortie de notre modèle  $Y$  peut s'exprimer comme une fonction des entrées de notre modèle  $X$ , c'est-à-dire  $Y = f(X)$ . Comme  $X = (X_1, \dots, X_n)$  peut prendre plein de valeurs possibles, il en résulte qu'il y a *a priori* plein de résultats possibles pour  $Y$ . L'objectif est alors de déterminer quelles entrées du modèle  $X_i$  induisent le plus de changements dans ces résultats possibles — dans cette variance qu'admet  $Y$ . À cette fin, on utilise les indices principaux de Sobol définis par

$$S_i = \frac{\mathbf{Var}(\mathbf{E}[Y|X_i])}{\mathbf{Var}(Y)}.$$

Ici,  $\mathbf{Var}(\mathbf{E}[Y|X_i])$  permet de voir l'effet du seul paramètre  $X_i$  sur la variance de  $Y$ . Diviser par la variance totale de  $Y$  permet de le faire relativement aux autres paramètres. Cet indice ne prend cependant pas en compte les interactions entre  $X_i$  et les autres entrées du modèle. Il faut pour ça utiliser les indices totaux de Sobol définis par

$$S_i^T = 1 - \frac{\mathbf{Var}(\mathbf{E}[Y|X_{\sim i}])}{\mathbf{Var}(Y)},$$

où  $X_{\sim i} = (X_1, \dots, X_{i-1}, X_{i+1}, \dots, X_n)$ . L'indice  $S_i^T$  ainsi défini permet lui de prendre en compte l'impact du paramètre  $X_i$  et de ses interactions sur la variance de  $Y$ . À noter que l'interaction entre  $X_i$  et  $X_j$  est à la fois prise en compte par  $S_i^T$  et  $S_j^T$ . C'est pour cette raison qu'il est souvent pertinent d'interpréter les indices principaux et les indices totaux conjointement.

Une fois que l'on connaît la sensibilité du modèle aux différents paramètres, on peut alors passer à la calibration desdits paramètres.

### 5.3 Algorithme d'optimisation

L'objectif de l'optimisation est de trouver les jeux de paramètres qui minimisent notre fonction de coût, ceux qui permettent d'ajuster au mieux les dynamiques de larves simulées aux dynamiques observées. Pour ce faire, on a besoin d'un algorithme d'optimisation. Et il y a du choix.

On peut déjà noter que nous avons sept paramètres à calibrer, et qu'ils évoluent tous dans des intervalles (que l'on définira plus tard). Il apparaît évident que toutes les solutions ne pourront pas être testées. Une solution peut être d'utiliser un algorithme basé sur une méthode MCMC comme l'algorithme du recuit simulé. Nous avons cependant trois dynamiques à ajuster (une pour chaque sous-parcelle), il faudrait alors minimiser la somme (ou la moyenne) des trois fonctions objectifs. Ou alors on peut directement utiliser un algorithme d'optimisation multicritères.

Ces algorithmes ont l'avantage de pouvoir optimiser simultanément des objectifs qui ne sont pas toujours comparables — à des échelles différentes, par exemple. Un des plus connus est sans conteste NSGA-II (Nondominated Sorting Genetic Algorithm II) [Deb et al., 2002]. C'est celui que l'on utilisera.

C'est un algorithme qui ne renvoie pas une unique solution mais un ensemble de solutions. Cet ensemble de solutions converge vers un sous-ensemble du front de Pareto. Le front de Pareto désigne l'ensemble des solutions non-dominées pour un problème donné. Dans  $P \subset \mathbf{R}^p$  ( $n > 1$ ), une solution  $x = (x_1, \dots, x_p) \in P$  est dite non-dominée lorsque

$$\{y \in P \mid \forall i \in \{1, \dots, p\}, y_i \succcurlyeq x_i \text{ et } \exists i \text{ tel que } y_i \succ x_i\} = \emptyset,$$

où  $\succcurlyeq$  et  $\succ$  veulent respectivement dire «au moins aussi bien que» et «meilleur que». Dans notre cas, vu que l'on veut minimiser notre fonction de coût,  $\succcurlyeq$  se traduira par  $\leq$  et  $\succ$  se traduira par  $<$ . En d'autres termes,  $x$  est non-dominée signifie qu'il n'existe pas de solution  $y$  qui soit strictement meilleure sur un des critères et au moins aussi bonne sur tous les autres critères.

Le front de Pareto étant un sous-ensemble de  $\mathbf{R}^p$ , il n'est (*a priori*) pas dénombrable. De ce fait, NSGA-II ne peut pas renvoyer le front tout entier mais seulement un sous-ensemble. C'est un algorithme itératif, les itérations seront appelées ici *générations*. Et il faut plusieurs générations pour se retrouver avec des solutions non-dominées. À la génération  $t$ , l'algorithme effectue plusieurs opérations.

1. On possède un ensemble de solutions potentielles que l'on nommera *population*. La taille de la population  $N$  est fixée arbitrairement.
2. À chaque solution de cette population  $P_t$ , on attribue une solution fille (on verra plus tard comment).

Avec la population  $P_t$  et les solutions filles associées  $F_t$ , cela forme un ensemble de solutions potentielles  $S_t$  de taille  $2N$ . On va alors sélectionner parmi ces solutions les  $N$  solutions qui nous intéressent le plus.

3. Pour ce faire, pour chaque solution potentielle  $s \in S_t$  :
  - on calcule le nombre  $n_s$  d'éléments de  $S_t$  qui dominent  $s$  ;
  - on établit l'ensemble  $D_s$  des autres solutions de  $S_t$  qui sont dominées par la solution  $s$ .
4. On répartit alors nos solutions en plusieurs groupes, en plusieurs *fronts*. Vont ainsi dans le premier front  $F_1$  les solutions  $s$  qui vérifient  $n_s = 0$ , qui ne sont donc pas dominées par d'autres solutions de  $S_t$ . Dans le deuxième front  $F_2$  se trouvent

les solutions qui sont dominées uniquement par les solutions présentes dans  $F_1$ . (Autrement dit, les solutions qui se trouvent dans et uniquement dans  $\bigcup_{s \in F_1} D_s$ .) On continue de la même manière pour  $F_3$  (qui contient les solutions uniquement dominées par celles de  $F_1$  et  $F_2$ ),  $F_4\dots$  jusqu'à ce que toutes les solutions de  $S_t$  soient assignées à un front.

5. On choisira alors de garder en priorité les solutions de  $F_1$  puis de  $F_2$  et ainsi de suite jusqu'à en obtenir  $N$ . Il faut noter qu'il existe probablement un front  $F_k$  où toutes les solutions ne pourront être garter pour ne pas dépasser la limite imposée de  $N$  solutions. Plutôt que de choisir aléatoirement le nombre nécessaires de solutions dans  $F_k$ , seront sélectionnées les solutions qui maximisent une certaine distance — the *crowding distance* — avec les autres solutions. (On n'entrera pas dans le détail ici). C'est fait pour assurer une certaine diversité entre les différentes solutions. Les  $N$  solutions ainsi sélectionnées constitueront  $P_{t+1}$ , la population initiale de la génération suivante  $t + 1$ .

Un élément important pour assurer une convergence vers le front de Pareto est le choix des solutions filles  $F_t$  effectué à chaque génération. Pour générer une solution fille, plusieurs étapes sont là aussi nécessaires. Ces étapes (simplifiées) sont :

1. On selectionne deux solutions  $s_1$  et  $s_2$  dans  $P_t$ .
2. On construit une solution fille  $f_1$  en prenant la moitié des coordonnées de  $s_1$  et l'autre moitié de  $s_2$ . On construit  $f_2$  en prenant les moitiés de  $s_1$  et  $s_2$  inutilisées dans la construction de  $f_1$ .
3. Sur chacune des solutions filles, une coordonnée choisie aléatoirement est remplacée par une valeur aléatoire choisie dans un intervalle centré sur la valeur initiale.
4. On réitère ces étapes jusqu'à avoir  $N$  solutions filles.

Et c'est ainsi qu'après un nombre suffisant d'itérations, et pour une taille de population suffisamment grande, l'algorithme NSGA-II renvoie un ensemble de points suffisamment proche du front de Pareto et qui en retranscrit sa diversité.

Dans notre cas, cela signifie que l'on possède différents jeux de paramètres et les valeurs de la fonction de coût pour les trois sous-blocs qu'ils produisent. Et qu'il ne reste plus qu'à faire un choix.

## 5.4 Exploration de l'ensemble des solutions

Choisir une solution n'est cependant pas trivial. En effet, les solutions possibles ne sont



# 6

## Mise en œuvre et résultats



# 7

## Conclusion

## Remerciements

Ce rapport de stage a été réalisé dans le cadre du projet ECOVERGER, action pilotée par le ministère de l'Agriculture et de l'alimentation et le ministère de la Transition écologique et solidaire, avec l'appui financier de l'Agence française pour la biodiversité dans le cadre de l'APR «Résistance et pesticides» grâce aux crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto et dans le cadre du programme de recherche agronomique du Cirad à la Réunion, DPP COSAQ, (activités 2015-2018) financé par la communauté européenne (fond structurel FEDER) et le Conseil Régional de La Réunion.



# Bibliographie

- P. Amouroux. *Bio-écologie et dynamique des populations de cécidomyie des fleurs (*Procontarinia mangiferae*), un ravageur inféodé au manguier (*Mangifera indica*), en vue de développer une lutte intégrée.* PhD thesis, La Réunion, 2013.
- P. Amouroux, F. Normand, and D. Vincenot. Guide de production intégrée de mangues à la Réunion, chapitre VII, 2009.
- P. Amouroux, F. Normand, H. Delatte, A. Roques, and S. Nibouche. Diapause incidence and duration in the pest mango blossom gall midge, *Procontarinia mangiferae* (Felt), on Reunion Island. *Bulletin of entomological research*, 104(5) :661–670, 2014.
- F. Boudon, S. Persello, A. Jestin, A.-S. Briand, P. Fernique, Y. Guédon, M. Léchaudel, I. Grechi, and F. Normand. An FSPM approach for modeling fruit yield and quality in mango trees. FSPMA, 2016.
- K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, and T. Meyarivan. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm : NSGA-II. *IEEE transactions on evolutionary computation*, 6(2) :182–197, 2002.
- Food and Agriculture Organization. <http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QC>, 2017. ONU. Site internet visité le 25 juin 2019.
- C. Magne. Effet de la charge en fruits sur la croissance végétative de plusieurs variétés de manguier à l'île de la Réunion. Master's thesis, Université Blaise Pascal, 2004.
- F. Normand. Guide de production intégrée de mangues à la Réunion, chapitre IV, 2009.
- F. Normand, A. K. P. Bello, C. Trottier, and P.-E. Lauri. Is axis position within tree architecture a determinant of axis morphology, branching, flowering and fruiting ? An essay in mango. *Annals of botany*, 103(8) :1325–1336, 2009.
- L. Saint-Criq. Modélisation du système manguier-cécidomyie des fleurs pour une évaluation de modes de gestion du ravageur et de ses dégâts. Master's thesis, Université Paul Sabatier, 2018.
- A. Saltelli, S. Tarantola, F. Campolongo, and M. Ratto. Sensitivity analysis in practice : a guide to assessing scientific models. *Chichester, England*, 2004.
- A. Saltelli, M. Ratto, T. Andres, F. Campolongo, J. Cariboni, D. Gatelli, M. Saisana, and S. Tarantola. *Global sensitivity analysis : the primer*. John Wiley & Sons, 2008.
- A. Saltelli, K. Aleksankina, W. Becker, P. Fennell, F. Ferretti, N. Holst, S. Li, and Q. Wu. Why so many published sensitivity analyses are false : A systematic review of sensitivity analysis practices. *Environmental modelling & software*, 114 :29–39, 2019.



# A

## Verger n°2

On présente ici le dispositif présent sur le verger expérimental n°2 ainsi que les dynamiques d'inflorescences et de larves obtenues grâce aux données des relevés effectués sur cette parcelle.

Le dispositif mis en place était similaire à celui du verger n°1, à la différence de l'ordre des modalités de couverture du sol (voir figure A.1).




FIGURE A.1 – Schéma de l'expérimentation menée. Le verger sur lequel ont été testées les trois modalités de couvertures du sol était situé à côté d'un autre verger. Bien que cet autre verger n'avait pas de rôle particulier, il a probablement servi de source d'infestation exogène au verger expérimental.

Le verger n°2 présente des caractéristiques particulières, rajoutant des différences supplémentaires entre les différentes sous-parcelles, en plus des différentes modalités. Ce verger est disposée «en escalier», avec une modalité sur chaque «marche». L'ensoleillement n'était pas le même entre les différentes modalités, et cela se ressent sur la figure A.2. La sous-parcelle avec un paillage synthétique — la plus ensoleillée — présente ainsi plus d'inflorescences que les deux autres. On retrouve aussi des différences d'inflorescences entre les parcelles enherbées, celle avec l'enherbement haut avait plus de soleil que l'autre, et elle a eu plus d'inflorescences.




FIGURE A.2 – Comparaison des différentes dynamiques d’inflorescences vivantes du verger n°2 en fonction du *dataset* utilisé. Même après correction, on observe des différences entre les dynamiques issues des différents jeu de données, en particulier pour les deux premières modalités.

On peut noter aussi des différences entre les deux jeux de données. C'est flagrant pour la modalité «paillage synthétique», où il n'y a seulement que 5 observations dans le *dataset 1* produisant cette dynamique particulière. À cela se rajoute la variabilité du phénomène donnant des dynamiques très différentes pour des échantillonnages différents. Seule la sous-parcelle avec un enherbement haut présente des dynamiques similaires entre les deux jeux de données.

Les dynamiques de larves pour ce verger sont visibles sur la figure A.3.




FIGURE A.3 – Dynamiques de larves s’éjectant des inflorescences des manguiers chaque jour dans le verger n°2 pour chacune des trois sous-parcelles. En gris sont visibles les dynamiques d’inflorescences vivantes (issues du *dataset* 2,  $I_t^2$ ).