



Tabak

Rauchen ist ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegenerkrankungen und verschiedene Krebsarten. Mehr als jeder siebte Todesfall ist Krankheiten zuzuschreiben, die durch Rauchen verursacht werden. Passivrauchen schadet der Gesundheit ähnlich stark wie das Rauchen.

Tabakkonsum

2012	Männer	Frauen
Raucher/in (%)	32,4	24,2
Tägliche Raucher/in (%)	23,1	17,9
Raucher/in, die mit dem Rauchen aufhören möchten (%)	60,4	60,2
Dem Passivrauchen ausgesetzte Nichtraucher/in (≥ 1 Stunde pro Tag) (%)	7,1	5,2


Bevölkerung ab 15 Jahren in Privathaushalten

Quelle: SGB

Tabakkonsum

Den höchsten Raucheranteil weisen die 25- bis 34-jährigen Männer (43%) und die 15- bis 24-jährigen Frauen auf (32%). Zwischen 1992 und 2012 ist der Anteil der rauchenden Personen bei den Männern von 37% auf 32% zurückgegangen, während er bei den Frauen stabil geblieben ist. Der Anteil der Personen, die mindestens 20 Zigaretten pro Tag rauchen, hat sich in diesem Zeitraum halbiert.

Tabakkonsum, 2012



Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB)


© BFS, Neuchâtel 2014

[Details und Download](#)

Raucher/innen nach Anzahl Zigaretten pro Tag

Bevölkerung in Privathaushalten ab 15 Jahren





Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB)

© BFS, Neuchâtel 2015


[Details und Download](#)

Passivrauchen

Seit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes zum Schutz vor Passivrauchen im Jahr 2010 ist die Passivrauchexposition weiter zurückgegangen. 2002 waren 26% der Nichtraucherinnen und Nichtraucher mindestens eine Stunde pro Tag dem Passivrauchen ausgesetzt. Dieser Anteil belief sich 2007 noch auf 16% und 2012 auf 6%.

Passivrauchen

Anteil der Nichtraucherenden, die mindestens eine Stunde pro Tag dem Rauch anderer ausgesetzt sind



Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB)

© BFS, Neuchâtel 2015

[Details und Download](#)

Weiterführende Informationen

Tabellen



[Konsum von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen nach Geschlecht und Alter](#)

Dargestellter Zeitraum: 1992, 1997, 2002, 2007, 2012

Bundesamt für Statistik



Veröffentlicht am 13.10.2014



[Gesundheitsrelevante Einstellungen und Verhaltensweisen](#)

Dargestellter Zeitraum: 1992, 1997, 2002, 2007, 2012

Bundesamt für Statistik

Veröffentlicht am 13.10.2014



[Tabakkonsum nach Alter, Geschlecht, Sprachgebiet, Bildungsniveau](#)

Dargestellter Zeitraum: 1992, 1997, 2002, 2007, 2012

Bundesamt für Statistik

Veröffentlicht am 13.10.2014



[Passivrauchen nach Alter, Geschlecht, Sprachgebiet, Bildungsniveau](#)

Dargestellter Zeitraum: 2007, 2012

Bundesamt für Statistik

Veröffentlicht am 10.10.2014

[Suche nach allen Tabellen](#)

Publikationen



Todesursachenstatistik

[Tabakbedingte Todesfälle in der Schweiz, 1995 bis 2012](#)

Bundesamt für Statistik,
Neuchâtel 2015, 4 Seiten

BFS-Nummer 1055-1200

Veröffentlicht am

15.10.2015

[Suche nach allen Publikationen](#)

Grundlagen und Erhebungen

[Erhebungen](#)

[Schweizerische Gesundheitsbefragung](#)

[Statistik der Todesursachen und Totgeburten](#)

Kontakt

Bundesamt für Statistik Sektionen Gesundheitsversorgung, Gesundheit der Bevölkerung

Espace de l'Europe 10

CH-2010 Neuchâtel

Schweiz

T... [+41 58 463 67 00](tel:+41584636700)

Von Montag bis Freitag

10.00–12.00 Uhr und 14.00–17.00 Uhr

✉ [Kontakt](#)

<https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/determinanten/tabak.html>