

Le médicament Arcalion est indiqué dans certains états de fatigue passagers de l'adulte. Disponible sans ordonnance, il contient 200 mg de sulbutiamine une substance apparentée à la vitamine B1.

Arcalion est également utilisé dans le traitement de certains états d'inhibition physique ou psychique avec baisse d'activité et apathie. En cas d'épisodes dépressifs avérés, la prise d'Arcalion ne dispense pas d'avoir un traitement antidépresseur spécifique.

Arcalion est un psychostimulant qui se caractérise par son action énergisante.

Posologie d'Arcalion

Ce médicament contre la fatigue passagère est réservé à l'adulte. La dose quotidienne recommandée est de 2 à 3 comprimés répartis sur les prises du matin et du midi.

Le traitement par Arcalion est limité à 4 semaines.

Contre-indications des comprimés Arcalion

Ce médicament contre la fatigue ne doit pas être pris si vous êtes allergique à la sulbutiamine ou à l'un des excipients (Amidon de maïs, empois d'amidon, glucose anhydre, lactose monohydraté, stéarate de magnésium, talc, bicarbonate de sodium, carmellose sodique, cire d'abeille blanche, dioxyde de titane (E171), éthylcellulose, laque aluminique de jaune orangé S (E110), monooléate de glycérol, polysorbate 80, povidone, saccharose, silice colloïdale anhydre (Aerosil 130)) des comprimés d'Arcalion.

Les comprimés Arcalion contiennent du lactose, du saccharose et du glucose : ils sont donc contre-indiqués si vous êtes intolérants à l'un de ces sucres.

Arcalion ne doit pas être utilisé chez l'enfant ou chez l'adolescent.

Il faut prévenir votre médecin que vous prenez de l'Arcalion si vous êtes sous traitement diurétique ou si vous devez subir une anesthésie générale car ce médicament peut augmenter les effets de certains agents bloquants neuro-musculaires.

La prise d'Arcalion est contre-indiqué chez la femme enceinte et au cours de l'allaitement.

En cas de surdosage, il est possible d'observer de l'agitation et des tremblements.

Des effets indésirables peu fréquents à type d'éruptions cutanées, de malaise, de maux de tête, de tremblements, d'agitation, de nausées ou de vomissements sont possible après la prise du médicament Arcalion.

Il est important de lire la notice avant de prendre ce médicament contre la fatigue.

Conditionnement : Boîte 60 comprimés



Mis à jour le : 15/12/2021