

- PRÉSENTATION
- CARACTÉRISTIQUES
- NOTICE

Les pastilles Humex Mal de Gorge miel citron sans sucre est un médicament en cas de maux de gorge peu intenses et sans fièvre, d'aphtes, de petites plaies dans la bouche.

Ce médicament contient un anesthésique local, le chlorhydrate de lidocaïne(dosé à 2 mg par pastille) et deux antiseptiques locaux, l'amylnmétacrésol (1,20 mg) et l'alcool 2.4-dichlorobenzylrique(0,60 mg).

Les autres composants sont : huile essentielle de menthe poivrée, jaune de quinoléine (E104), saccharine sodique, acide tartrique, isomalt (E953), maltitol (E965), jaune orangé S (E110), huile essentielle de citron, arôme miel.

Ces pastilles peuvent être prises par les enfants de plus de 6 ans et les adultes.

La boîte contient 24 pastilles.

## Posologie de Humex Mal de Gorge miel citron sans sucre

Les adultes doivent prendre une pastille à laisser fondre lentement dans la bouche sans la croquer, on pourra renouveler la prise si nécessaire au bout de 2 heures, sans dépasser 8 pastilles par jour.

Les enfants de 6 à 15 ans pourront prendre une pastille que l'on peut renouveler si nécessaire au bout de 2 heures, sans dépasser 4 pastilles par jour.

Les pastilles doivent être prises à distance des repas. Le traitement ne doit pas durer plus de 5 jours. Si les symptômes persistent ou que votre état s'aggrave, consultez votre médecin.

Attention, ne à ne pas faire de surdosage, en effet, pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament passe dans la circulation sanguine, est peut avoir des répercutions sur le système nerveux avec

possibilité de convulsions et sur le cœur.

## Précautions d'emploi des pastilles Humex Mal de Gorge

Les pastilles Humex Mal de Gorge miel citron sans sucre ne doivent pas être prise si vous êtes allergique à un composant de ces pastilles. (colorant azoïque (E110)).

Si vous avez une intolérance à certains sucres ou une intolérance au fructose, ce médicament vous est déconseillé.

Si vous avez des lésions étendues, des extensions des lésions, une apparition de fièvre, vous devez consulter votre médecin.

Ce médicament peut provoquer des troubles digestifs légers (diarrhée). Valeur calorique 2.3 kcal de maltitol (ou isomaltitol).

Il vous est conseillé d'informer votre pharmacien ou médecin de tout médicament que vous prenez en parallèle pour éviter les surdosages et les interactions.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez il est préférable d'avoir un avis médical avant d'utiliser ces pastilles.

Les sportifs peuvent avoir une réaction positive aux tests anti-dopage avec ce médicament.