

Les comprimés homéopathiques Sélénium complexe n°99 des laboratoires Lehning sont traditionnellement utilisés dans la fatigue et le surmenage physique. Ce médicament est disponible sans ordonnance et réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

Composition du complexe n°99 Sélénium

Pour un comprimé contre la fatigue, on retrouve 25 mg des souches homéopathiques suivantes : Selenium metallicum 3 DH, Aurum muriaticum natronatum 4 DH, Chininum sulfuricum 4 DH, Ferrum phosphoricum 3 DH, Natrum carbonicum 3 DH, Ginseng 4 DH, Kola 3 DH, Conium maculatum 4 DH, Damiana 4 DH.

Les excipients du complexe Sélénium n°99 sont le lactose monohydraté, le stéarate de magnésium et l'amidon de riz.

Posologie des comprimés contre la fatigue physique

Chez l'adulte, prendre 2 comprimés 2 à 3 fois par jour. Chez l'enfant à partir de 6 ans, donner 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

Les comprimés homéopathiques n°99 sont à prendre en dehors des repas soit en les croquant soit en les laissant fondre sous la langue.

Précautions d'emploi

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants présents dans la formule.

Les comprimés n°99 de Sélénium Lehning contiennent du lactose et sont donc contre-indiqués en cas de syndrome de malabsorption du glucose et/ou du galactose, une intolérance au galactose ou un syndrome de Lapp.

Lire attentivement la notice avant de démarrer ce traitement homéopathique contre la fatigue.

Contenance : 60 comprimés

Sélénium

Complexe n°99

comprimé

FATIGUE PHYSIQUE

INDICATIONS

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans la fatigue et le surmenage physique.

COMPOSITION

Selenium metallicum	3 DH	25 mg.
Aurum murtaticum natronatum	4 DH	25 mg.
Chininum sulfuricum	4 DH	25 mg.
Ferrum phosphoricum	3 DH	25 mg.
Natrum carbonicum	3 DH	25 mg.
Ginseng	4 DH	25 mg.
Kola	3 DH	25 mg.
Conium maculatum	4 DH	25 mg.
Damiana	4 DH	25 mg.

pour un comprimé de 250 mg.
Excipient à effet notoire : lactose.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Adultes : 2 comprimés 2 à 3 fois par jour.
Enfants de plus de 6 ans : 1 comprimé 2 à 3 fois par jour. Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes. Médicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans. Comprimés à croquer et laisser fondre sous la langue, de préférence en dehors des repas. Voie orale.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS

Médicament non soumis à prescription médicale.

PHYSICAL OVERWORK

Adults: 2 tablets 2 to 3 times a day.

Children over 6 years of age: 1 tablet

2 to 3 times a day. Reduce the frequency of administrations if there is an improvement and stop taking the drug if the symptoms disappear. Medicine for adults and children over 6 years of age only. Bite tablets and let them dissolve under the tongue, preferably not with meals. Oral use.

Read carefully the package leaflet before use.

Excipient with known effect: lactose.

KEEP OUT OF THE REACH AND SIGHT OF CHILDREN.

Store below 25°C.

Titulaire / Exploitant / Fabricant

Laboratoires Lehning

3 rue du Petit Morais

57640 Sainte-Barbe, France.

Médicament autorisé

n° 2760-18.334

CP 34009 305 935 3 0.

Mis à jour le : 29/06/2020