

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 1. stopnja

Benjamin Benčina  
**Topološke grupe**

Delo diplomskega seminarja

Mentor: doc. dr. Marko Kandič

Ljubljana, 2019

## KAZALO

1. Uvod	4
2. Kaj je topološka grupa	4
2.1. Primeri topoloških grup	5
3. Separacijski aksiomi in metrizabilnost	5
3.1. Metrizabilnost	5
3.2. Separacijski aksiomi do $T_{3\frac{1}{2}}$	6
3.3. Separacijski aksiom $T_4$	6
4. Kvocienti topoloških grup	6
5. Izreki o izomorfizmih	7
5.1. Prvi izrek o izomorfizmih	7
5.2. Drugi izrek o izomorfizmih	7
5.3. Tretji izrek o izomorfizmih	8
6. Izreki tipa "2 od 3"	8
Slovar strokovnih izrazov	8
Literatura	8

## Topološke grupe

POVZETEK

povzetek HERE

## Topological groups

ABSTRACT

ABSTRACT HERE

**Math. Subj. Class. (2010):** 43-00

**Ključne besede:** grupa topologija

**Keywords:** group topology

## 1. UVOD

## 2. KAJ JE TOPOLOŠKA GRUPA

**Definicija 2.1.** Neprazna množica  $G$  z binarno operacijo  $*$  je *grupa*, če:

- (1) je množica  $G$  zaprta za (ponavadi binarno) operacijo  $*$ ,
- (2) je operacija  $*$  asociativna v množici  $G$ ,
- (3) v  $G$  obstaja tak element  $e$  (imenujemo ga *enota*), da za vsak element  $x$  množice  $G$  veljajo enakosti

$$x * e = e * x = x,$$

- (4) za vsak element  $x$  množice  $G$  obstaja element  $y$  tudi iz množice  $G$ , da veljajo enakosti

$$x * y = y * x = e.$$

Oznaka za grupo je  $(G, *)$  ali samo  $G$ , če je operacija znana ali drugače očitna.

Iz zgornje definicije je razvidno, da nam grupna struktura na množici porodi dve strukturni preslikavi:

- *množenje*  $\mu : G \times G \rightarrow G, (x, y) \mapsto x * y$ ,
- *invertiranje*  $\iota : G \rightarrow G, x \mapsto x^{-1}$ .

Definiramo lahko nekaj tipov preslikav med grupami.

**Definicija 2.2.** Naj bo  $f : (G, *) \rightarrow (\tilde{G}, \star)$  preslikava med dvema grupama.

- (1) Preslikava  $f$  je *homomorfizem*, če za vsaka dva elementa  $a, b \in G$  velja  $f(a * b) = f(a) \star f(b)$ .
- (2) Preslikava  $f$  je *izomorfizem*, če je bijektivni homomorfizem.

**Definicija 2.3.** *Topologija* na neprazni množici  $X$  je družina podmnožic  $\tau \subseteq 2^X$  z lastnostmi:

- (1)  $X \in \tau, \emptyset \in \tau$ ,
- (2) za poljubni dve množici  $U, V \in \tau$  je tudi presek  $U \cap V \in \tau$ ,
- (3) za poljubno poddružino  $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subseteq \tau$  je tudi unija  $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda \in \tau$ .

Množici  $X$ , opremljeni s topologijo  $\tau$ , rečemo *topološki prostor*  $(X, \tau)$  in množice v družini  $\tau$  označimo za *odprte* množice v topološkem prostoru  $X$ . *Zaprte* množice definiramo kot komplemente odprtih množic glede na množico  $X$ .

S pomočjo odprtih in zaprtih množic topološkega prostora  $X$  lahko sedaj definiramo zveznost in odprtost preslikave med dvema topološkima prostoroma ter pojem homeomorfizma.

**Definicija 2.4.** Naj bo  $f : (X, \tau_1) \rightarrow (Y, \tau_2)$  preslikava med topološkima prostoroma.

- (1) Preslikava  $f$  je *zvezna*, kadar je praslika preslikave  $f$  vsake odprte množice v topološkem prostoru  $(Y, \tau_2)$  odprta tudi v topološkem prostoru  $(X, \tau_1)$ .
- (2) Preslikava  $f$  je *odprta*, kadar je slika vsake odprte množice v topološkem prostoru  $(X, \tau_1)$  odprta tudi v topološkem prostoru  $(Y, \tau_2)$ .
- (3) Preslikava  $f$  je *homeomorfizem*, če je bijektivna, zvezna in ima zvezen inverz.

Končno lahko strukturi združimo in povežemo ter definiramo pojem topološke grupe.

**Definicija 2.5.** *Topološka grupa* je grupa  $(G, *)$  opremljena s tako topologijo  $\tau$  na množici  $G$ , da sta za  $\tau$  strukturni operaciji množenja in invertiranja zvezni.

Potrebujemo le še tip preslikave med topološkimi grupami, ki bo ohranjal tako algebraično kot topološko strukturo.

**Definicija 2.6.** Preslikava med dvema topološkima grupama je *topološki izomorfizem*, če je izomorfizem in homeomorfizem.

**Trditev 2.7.** *Naj bo  $G$  topološka grupa in  $a \in G$ . Leva translacija  $x \mapsto ax$  in desna translacija  $x \mapsto xa$  za  $a$  sta homeomorfizma iz  $G$  v  $G$ . Prav tako je preslikava invertiranja homeomorfizem iz  $G$  v  $G$ .*

**Trditev 2.8.** *Naj bo  $G$  topološka grupa in  $\mathcal{U}$  odprta baza okolic enote  $e$ . Tedaj veljajo naslednje trditve:*

- (1) *za vsako množico  $U \in \mathcal{U}$  obstaja množica  $V \in \mathcal{U}$ , da velja  $V^2 \subset U$ ;*
- (2) *za vsako množico  $U \in \mathcal{U}$  obstaja množica  $V \in \mathcal{U}$ , da velja  $V^{-1} \subset U$ ;*
- (3) *za vsako množico  $U \in \mathcal{U}$  in vsak element  $x \in U$  obstaja množica  $V \in \mathcal{U}$ , da velja  $xV \subset U$ ;*
- (4) *za vsako množico  $U \in \mathcal{U}$  in vsak element  $x \in G$  obstaja množica  $V \in \mathcal{U}$ , da velja  $xVx^{-1} \subset U$ .*

*Naj bo  $G$  sedaj grupa (ne topološka) in  $\mathcal{U}$  družina podmnožic množice  $G$ , za katero veljajo zgornje štiri lastnosti. Naj bodo poljubni končni preseki množic iz  $\mathcal{U}$  neprazni. Tedaj je družina  $\{xU\}$ , kjer  $U \in \mathcal{U}$  in  $x \in G$  odprta podbaza za neko topologijo na  $G$ . S to topologijo je  $G$  topološka grupa. Družina  $\{Ux\}$  je odprta podbaza za isto topologijo.*

*Če velja še, da za vsaki množici  $U, V \in \mathcal{U}$  obstaja množica  $W \in \mathcal{U}$ , da velja  $W \subset U \cap V$ , potem sta družini  $\{xU\}$  in  $\{Ux\}$  tudi odprti bazi za to topologijo.*

**Trditev 2.9.** *Vsaka topološka grupa  $G$  ima odprto bazo okolic  $\mathcal{U}$  enote  $e$ , da za vsako okolico  $U$  velja  $U = U^{-1}$ . Tej lastnosti množic pravimo simetričnost.*

**Posledica 2.10.** *Naj bo  $G$  topološka grupa. Za vsako okolico  $U$  enote  $e$  obstaja okolica  $V$  enote  $e$ , da velja  $V^{-1} \subset U$ .*

## 2.1. Primeri topoloških grup.

### 3. SEPARACIJSKI AKSIOMI IN METRIZABILNOST

**Izrek 3.1.** *Naj bo  $G$  topološka grupa, ki zadošča separacijskemu aksiomu  $T_0$ . Tedaj je  $G$  regularna kot topološki prostor.*

#### 3.1. Metrizabilnost.

**Izrek 3.2.** *Naj bo  $\{U_k\}_{k=1}^{\infty}$  tako zaporedje simetričnih okolic enote  $e$  v topološki grupi  $G$ , da za vsak  $k \in \mathbb{N}$  velja  $U_{k+1}^2 \subset U_k$ . Označimo  $H = \bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$ . Potem obstaja taka levoinvariantna pseudo-metrika  $\sigma$  na  $G$  z naslednjimi lastnostmi:*

- (1)  *$\sigma$  je enakomerno zvezna na levi uniformni strukturi od  $G \times G$ ;*
- (2)  *$\sigma(x, y) = 0$  natanko tedaj, ko velja  $y^{-1}x \in H$ ;*
- (3)  *$\sigma(x, y) \leq 2^{-k+2}$ , če velja  $y^{-1}x \in U_k$ ;*
- (4)  *$2^{-k} \leq \sigma(x, y)$ , če velja  $y^{-1}x \notin U_k$ .*

*Če velja še  $xU_kx^{-1} = U_k$  za vsak  $x \in G$  in  $k \in \mathbb{N}$ , potem je  $\sigma$  tudi desnoinvariantna in velja*

(5)  $\sigma(x^{-1}, y^{-1}) = \sigma(x, y)$  za vsaka dva elementa  $x, y \in G$ .

**Izrek 3.3.** Naj bo  $G$  topološka grupa, ki zadošča separacijskemu aksiomu  $T_0$ . Potem je  $G$  metrizabilna kot topološki prostor natanko tedaj, ko obstaja števna odprta baza okolic enote  $e$ .

### 3.2. Separacijski aksiomi do $T_{3\frac{1}{2}}$ .

**Izrek 3.4.** Naj bo  $G$  topološka grupa, ki zadošča separacijskemu aksiomu  $T_0$ . Naj bo  $a \in G$  in  $F$  zaprta podmnožica v  $G$ , ki ne vsebuje  $a$ . Potem obstaja taka zvezna realna funkcija  $\psi$  definirana na  $G$ , da je  $\psi(a) = 0$  in  $\psi(x) = 1$  za vsak  $x \in F$ .

Drugače: vsaka  $T_0$  topološka grupa je popolnoma regularna.

### 3.3. Separacijski aksiom $T_4$ .

**Izrek 3.5.** Če je  $m$  katerokoli neštevno kardinalno število, potem je  $\mathbb{Z}^m$  nenormalna popolnoma regularna topološka grupa.

**Izrek 3.6.** Vsaka lokalno kompaktna topološka grupa, ki zadošča separacijskemu aksiomu  $T_0$ , je parakompaktna in zato normalna.

## 4. KVOCIENTI TOPOLOŠKIH GRUP

**Trditev 4.1.** Naj bo  $G$  topološka grupa in  $H$  njena podgrupa. Z relativno topologijo podprostora  $H$  topološkega prostora  $G$  je tudi  $H$  topološka grupa.

**Trditev 4.2.** Naj bo sta  $A$  in  $B$  podmnožici topološke grupe  $G$ . Veljajo naslednje trditve:

- (1)  $\overline{A} \overline{B} \subset \overline{AB}$ ,
- (2)  $(\overline{A})^{-1} = \overline{A^{-1}}$ ,
- (3)  $x\overline{A}y = \overline{xAy}$  za vsaka dva  $x, y \in G$ .

Če  $G$  ustreza še separacijskemu aksiomu  $T_0$ , velja tudi:

- (4) če za vsaka dva elementa  $a \in A$  in  $b \in B$  velja enakost  $ab = ba$ , potem velja enakost  $ab = ba$  tudi za vsaka dva elementa  $a \in \overline{A}$  in  $b \in \overline{B}$ .

**Trditev 4.3.** Naj bo  $G$  topološka grupa in  $H$  njena podgrupa.  $H$  je odprta natanko tedaj, ko ima neprazno notranjost. Vsaka odprta podgrupa  $H$  topološke grupe  $G$  je tudi zaprta.

**Trditev 4.4.** Naj bo  $U$  simetrična okolica enote  $e$  v topološki grupi  $G$ . Potem je  $L = \bigcup_{n=1}^{\infty} U^n$  odprta in zaprta podgrupa topološke grupe  $G$ .

**Definicija 4.5.** Naj bo  $G$  topološka grupa in  $H$  njena podgrupa. Naj bo  $\varphi$  naravni homomorfizem  $x \mapsto xH$  iz  $G$  v kvocient  $G/H = \{xH; x \in G\}$ . Na kvocientu  $G/H$  lahko definiramo kvocientno topologijo  $\theta$  s pomočjo naravnega homomorfizma: podmnožica kvocienta  $\{aH; a \in A, A \subseteq G\}$  je v kvocientu odprta natanko tedaj, ko je  $\varphi^{-1}(\{aH; a \in A, A \subseteq G\})$  odprta množica v  $G$ .

**Opomba 4.6.** Z drugimi besedami to pomeni, da je  $\{aH; a \in A, A \subseteq G\}$  v kvocientu odprta natanko tedaj, ko je  $AH$  odprta v  $G$ . Ker je  $H$  podgrupa grupe  $G$ , velja enakost  $\{aH; a \in A\} = \{aH; a \in AH$ . Torej so odprte množice v kvocientu  $G/H$  oblike  $\{uH; u \in U\}$ , kjer je  $U$  odprta podmnožica v  $G$ .

**Izrek 4.7.** Kvocientna topologija  $\theta$  je res topologija na množici  $G/H$ . Glede topologijo  $\theta$  je naravni homomorfizem  $\varphi$  zvezen in  $\theta$  je najmočnejša topologija na kvocientu  $G/H$ , glede na katero je naravni homomorfizem  $\varphi$  zvezen.

Kvocientu  $G/H$  s kvocientno topologijo  $\theta$  rečemo *kvocientni prostor*.

**Trditev 4.8.** Naravni homomorfizem  $\varphi$  iz  $G$  v kvocient  $G/H$  je odprta preslikava.

**Trditev 4.9.** Naj bo  $G$  topološka grupa,  $H$  njena podgrupa in  $U, V$  tako okolici enote  $e$  v  $G$ , da velja  $V^{-1}V \subset U$ . Naj bo  $\varphi$  naravni homomorfizem iz grupe  $G$  v kvocient  $G/H$ . Potem velja  $\varphi(\overline{V}) \subset \varphi(U)$ .

**Izrek 4.10.** Naj bo  $G$  topološka grupa in  $H$  njena podgrupa. Veljajo naslednje trditve:

- (1) kvocientni prostor  $G/H$  je diskreten natanko tedaj, ko je  $H$  odprta v  $G$ ,
- (2) če je  $H$  zaprta v  $G$ , potem je kvocient  $G/H$  regularen topološki prostor,
- (3) če kvocientni prostor  $G/H$  zadošča separacijskemu aksiomu  $T_0$ , potem je  $H$  zaprta v  $G$  in velja, da je kvocient  $G/H$  regularen topološki prostor.

**Izrek 4.11.** Naj bo  $G$  topološka grupa in naj bo  $H$  njena podgrupa edinka. Naj bo kvocient  $G/H$  opremljen s kvocientno topologijo  $\theta$ . Veljajo naslednje trditve:

- (1) kvocient  $G/H$  je topološka grupa s topologijo  $\theta$ ,
- (2) naravni homomorfizem  $\varphi$  iz  $G$  v  $G/H$  je odprt in zvezen homomorfizem,
- (3) kvocient  $G/H$  je diskreten natanko tedaj, ko je podgrupa  $H$  odprta v  $G$ ,
- (4) kvocient  $G/H$  zadošča separacijskemu aksiomu  $T_0$  (in je zato tudi regularen) natanko tedaj, ko je podgrupa  $H$  zaprta v  $G$ .

## 5. IZREKI O IZOMORFIZMIH

**Trditev 5.1.** Naj bo  $G$  topološka grupa in  $H$  njena podgrupa. Naj bo za vsak element  $a \in G$  na kvocientu  $G/H$  definirana preslikava  $\psi_a$  s predpisom  $\psi_a(xH) = (ax)H$ . Za vsak element  $a \in G$  je  $\psi_a$  homeomorfizem na prostoru  $G/H$ .

**Opomba 5.2.** Če za vsaki dve točki  $x, y$  topološkega prostora  $X$  velja, da na prostoru  $X$  obstaja homeomorfizem, ki preslika točko  $x$  v točko  $y$ , rečemo, da je  $X$  kot topološki prostor *homogen*. Zgornja trditev pravi, da je kvocientni prostor  $G/H$  homogen topološki prostor.

**Trditev 5.3.** Naj bo  $G$  (lokalno) kompaktna topološka grupa in naj bo  $H$  njena podgrupa. Potem je tudi kvocientni prostor  $G/H$  (lokalno) kompakten.

### 5.1. Prvi izrek o izomorfizmih.

**Izrek 5.4** (Prvi izrek o izomorfizmih za topološke grupe). Naj bo  $G$  topološka grupa z enoto  $e$  in  $\tilde{G}$  topološka grupa z enoto  $\tilde{e}$ . Naj bo preslikava  $f$  odprt, zvezen homomorfizem iz  $G$  v  $\tilde{G}$ . Potem je jedro preslikave  $f$   $\ker f = f^{-1}(\tilde{e}) = H$  podgrupa edinka v topološki grupi  $G$  in množice  $f^{-1}(\tilde{x})$ , kjer je  $\tilde{x} \in \tilde{G}$  so disjunktni odseki podgrupe  $H$  v grupi  $G$ . Preslikava  $\Phi$  iz  $\tilde{G}$  v  $G$  s predpisom  $\tilde{x} \mapsto f^{-1}(\tilde{x})$  je homeomorfizem in izomorfizem iz  $\tilde{G}$  v topološko grupo  $G/H$  s kvocientno topologijo  $\theta(G/H)$ .

### 5.2. Drugi izrek o izomorfizmih.

**Izrek 5.5.** Naj bo  $G$  topološka grupa,  $A$  njena podgrupa in  $H$  podgrupa edinka grupe  $G$ . Naj bo  $\tau$  izomorfizem iz kvocienta  $(AH)/H$  v kvocient  $A/(A \cap H)$  s predpisom  $\tau(aH) = a(A \cap H)$ , kjer je  $a \in A$ . Potem  $\tau$  slika odprte množice iz  $(AH)/H$  v odprte množice iz  $A/(A \cap H)$ .

**Izrek 5.6** (Drugi izrek o izomorfizmih za topološke grupe). *Naj bodo objekti  $G, A, H$  in  $\tau$  isti kakor v izreku 5.5. Naj bo podgrupa  $A$  še lokalno kompaktna in  $\sigma$ -kompaktna, naj bo  $H$  zaprta v  $G$  in  $AH$  lokalno kompaktna. Tedaj je  $\tau$  homeomorfizem ter topološki grupi  $(AH)/H$  in  $A/(A \cap H)$  sta topološko izomorfni.*

### 5.3. Tretji izrek o izomorfizmih.

**Izrek 5.7.** *Naj bo  $G$  topološka grupa z enoto  $e$  in naj bo  $\tilde{G}$  topološka grupa z enoto  $\tilde{e}$ . Naj bo  $f$  odprt, zvezen homomorfizem iz grupe  $G$  v grupo  $\tilde{G}$ . Naj bo  $\tilde{H}$  podgrupa edinka grupe  $\tilde{G}$ . Označimo  $H = f^{-1}(\tilde{H})$  in  $N = f^{-1}(\tilde{e})$  ( $N$  je jedro homomorfizma  $f$ ). Potem so grupe  $G/H$ ,  $\tilde{G}/\tilde{H}$  in  $(G/N)/(H/N)$  topološko izomorfne.*

Izrek lahko preoblikujemo v obliko, ki je bolj podobna algebraični različici in ne vsebuje posredne topološke grupe  $\tilde{G}$ .

**Izrek 5.8** (Tretji izrek o izomorfizmih za topološke grupe). *Naj bo  $G$  topološka grupa in  $H, N$  taki njeni podgrupi edinki, da velja  $N \subset H$ . Potem sta kvocientni topološki grupi  $G/H$  in  $(G/N)/(H/N)$  topološko izomorfni.*

## 6. IZREKI TIPA “2 OD 3”

### SLOVAR STROKOVNIH IZRAZOV

### LITERATURA

- [1] E. Hewitt in K. A. Ross, *Abstract Harmonic Analysis I*, Springer-Verlag, New York, 1979.